

فلورام - 30 %

محلول للحقن

التركيب: كل مل يحتوي على:

300 ملغم

فلورفينيكول

الخواص:

- يتميز الفلورفينيكول بفاعليته العالية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية والسلبية.
- يثبط تخليق البروتين في البكتيريا وذلك من خلال ارتباطه بجزيء الرايبوسوم في الخلية البكتيرية.

الإستطبابات:

- معالجة أمراض الجهاز التنفسي البكتيرية في الأبقار والخنازير:
 - الأبقار: الأمراض التنفسية المتسببة عن البكتيريا (الباستريلا ملتوسيدا، الهيسطوفيلوس سومني ، والمانهيما ميلونكا).
 - تعفن الظلف في الأبقار الناتج عن بكتيريا (فيوزو باكتيريوم نكروفورم ، وبكتيريا ميلانينوجنكس).
 - الخنازير: الأمراض التنفسية المتسببة عن البكتيريا (العصيات الشعاعية والباستريلا ملتوسيدا وسالمونيلا كوليرا الخنزيرية والمكورات العقدية الخنزيرية).

الجرعات: يعطى حقناً بالعضل او تحت الجلد.

- الأبقار: يعطى حقناً في عضلة الرقبة: 10 مل /150 كغم وزن جسم (20 ملغم مادة فعالة / كغم وزن جسم). يمكن تكرار الجرعة بعد يومين في مكان آخر في عضلة الرقبة . أو يعطى حقناً تحت الجلد في منطقة الرقبة ولمرة واحدة: (20 مل/150 كغم وزن جسم). (40 ملغم مادة فعالة /كغم وزن جسم).
- الخنازير: يعطى حقناً بالعضل : 1مل/20 كغم وزن جسم (15 ملغم مادة فعالة/كغم وزن جسم). يمكن تكرار الجرعة بعد يومين.

فترة الأمان:

- لاستهلاك اللحوم:
- الأبقار : 28 يوماً عند حقنه بالعضل.
- : 38 يوماً عند حقنه تحت الجلد.
- الخنازير: 18 يوماً.

تنبيهات:

- لا يستخدم للحيوانات الحلوب.
- لا يعطي في مرحلة التربية.
- يجب عدم حقن أكثر من (10) مل في موقع واحد (للأبقار).
- يجب عدم حقن أكثر من (3) مل في موقع واحد (للخنازير).
- يجب تقسيم الجرعة على مواقع حقن مختلفة.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م°.

العبوات: (50، 100) مل.