

AMPROCOX АМПРОКОКС

Водорастворимый порошок

VARCO

противококцидиозные

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Ампролиум HCL	200 мг
Сульфатиноксалин Na	200 мг
Витамин К3	2 мг
Витамин А	10 000 М.Е.

СВОЙСТВА:

- Эффективная комбинация Ампролиум и Сульфатиноксалин, которая усиливает спектр активности продукта.
- Ампролиум эффективен против различных видов *Eimeria* spp. Кокцидий. Он действует против шизонтов первого поколения развивающихся кокцидий.
- Сульфатиноксалин эффективен против цекаловых и кишечных кокцидий, и он обладает антибактериальной активностью против сальмонеллы и пастуреллы. Эффективен также против шизонтов второго поколения кокцидий.
- Витамин К смягчает любой возможный, незначительный вред сульфид компонента.
- Витамин А защищает и восстанавливает поврежденный эпителий кишечной оболочки, вызванный кокцидами и другими инфекциями, поэтому целостность эпителия жизненно важна для восстановления нормальных функций кишечника (поглощение питательных веществ и предотвращение инвазивных бактерий).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Профилактика и лечение кокцидиоза, диареи, энтерита и бактериальных инфекций, вызванных *E.coli*, *Salmonella*, *Staph*, *Pasteurella* у домашней птицы (цыплят, индюков), кроликов и мелких жвачных животных.

ДОЗИРОВКА:

- **Лечение:**
- **Птица:** 100 г на 200 литров питьевой воды в течение 3 дней, после чего следует давать простую воду в течение 2 дней, затем - лечебную воду следующие 3 дня.
- **Кролики:** 0,5 г на литр питьевой воды в течение 3-4 дней.
- **Ягнят, козлят, телят:** 2 г на 10 кг массы тела ежедневно с водой в течение 3-4 дней.
- **С кормом:** 1 кг на тонну за тот же период.
- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: для потребления мяса: 7 дней.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Настоятельно рекомендуем использовать Неомицин или Колистин (600, 80) в течение 3-5 дней вместе с Ампрококс для лечения вторичной инфекции кишечника, вызванной кокцидиозом.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не рекомендуется использовать для кур-несушек и дойных животных.
- Обеспечьте достаточный водозабор во время лечения, чтобы уменьшить риск образования кристаллов.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.