

أمبروكوكس

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:

| | | |
|--------|------------|------------------------|
| 200 | ملغم | امبروليوم هيدروكلورايد |
| 200 | ملغم | سلفاكوينوكزالين صوديوم |
| 2 | ملغم | فيتامين ك3 |
| 10.000 | وحدة دولية | فيتامين أ |

الخواص:

- تركيبة مشتركة وفعالة تزيد من التأثير العلاجي للمستحضر.
- الامبروليوم: فعال ضد انواع اليميريا المختلفة المسببة للكوكسيديا حيث يؤثر على المراحل الاولى اللاتزاوجية (الشيزونت) في دورة حياتها.
- السلفاكوينوكزالين: يؤثر ايضاً على مرحلة الشيزونت ، فيما تتركز فعاليته ضد الكوكسيديا الاعورية والمعوية بشكل خاص، هذا بالاضافة الى فعاليته ضد بكتيريا السالمونيلا والباستريلا.
- فيتامين ك: يخفف من أية تأثيرات ضارة محتملة على الجسم قد تنتج عن مادة السلفا.

الإستطبايات:

- للوقاية ومعالجة الكوكسيديا والاسهالات والنزلات المعوية المتسببة عن بكتيريا الكولاي والسالمونيلا والمكورات العنقودية والباستريلا في الدواجن وطيور الحبش (الرومي) والارانب والمجترات الصغيرة.

الجرعات:

المعالجة:

- الدواجن: 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة ثلاثة ايام، ثم يعطى الماء فقط لمدة يومين متتاليين، ثم تستمر المعالجة لمدة ثلاثة ايام اخرى.
- الارانب: 0.5 غم لكل لتر من ماء الشرب لمدة 3-4 ايام.
- الحملان والسخول والعجول: 2 غم لكل 10 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب ولمدة 3-4 ايام.
- بواسطة العلف: 1 كغم لكل طن وللمدة نفسها.
- الوقاية:
- نصف الجرعة العلاجية وللمدة نفسها.

فترة الامان :

- لاستهلاك اللحوم: اسبوع.

تنبيهات:

- لا يعطى للقطعان البيضاء او للحيوانات الحلابة.
- اثناء المعالجة ، يجب تزويد القطعان بكميات كافية من ماء الشرب ، تجنباً لتبلور وترسب السلفا في جسم الحيوان.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.