

BLAST- 44.1%

БЛАСТ-44.1%

Класс:
Бензотиадиазины

ГЕРБИЦИД РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Избирательный контактный гербицид, поглощается листвой и корнями; используют для подавления развития однолетних широколистных сорняков.

СОСТАВ: Каждый литр содержит:

БЕНТАЗОН 44,1% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

БЛАСТ-44,1%: избирательный контактный гербицид для борьбы с однолетними широколиственными сорняками.

БЛАСТ-44,1%: имеет низкую токсичность для млекопитающих, не токсичен для пчел и токсичен для рыб.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

Контролирует развитие многих сорняков среди фасоли, бобов, кукурузы, арахиса, гороха, рис, мяты перечной, сорго.

СОРНЯКИ	140 мл/Донум ⁽¹⁾		210 мл/Донум		285 мл/Донум	
	Листов ая фаза	Максим альная высота	Листов ая фаза	Максима льная высота	Листова я фаза	Максима льная высота
Халикакаб	-	-	2-4	5 см	4-6	7.5 см
Вьюнок	-	-	-	-	-	25 см
Гречиха	-	-	до 4	7.5 см	4-6	12.5 см
Дурнишник ⁽²⁾	2-4	10 см	2-6	15 см	6-10	25 см
Дикий чертополох ⁽³⁾	-	-	-	-	-	20 см До цветения
Коммелина	-	-	до 6	10 см	6-10	20 см
Кротон	-	-	до 2	5 см	2-4	10 см

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Крестовник	-	-	-	-	-	7.5 см
Дурман	до 4	10 см	до 6	15 см	6-10	25 см
Горец почечуйный	до 4	10 см	до 6	15 см	6-10	25 см
Лебеда обыкновенная	до 4	2.5 см	до 6	4 см	до 6	5 см
Ромашка непахучая	-	-	-	5 см	-	7.5 см
Ипомея (вьюнок пурпурный)	-	-	4	10 см	6	15 см
Горчица полевая	до 4	5 см	до 6	10 см	6-10	20 см

Паслен	-	-	-	-	2-6	10 см
Понсеттия ⁽³⁾	-	-	до 6	10 см	4-8	15 см
Портулак	-	-	до 4	2.5 см	4-6	5 см
Редька дикая	-	-	2-6	10 см	6-10	25 см
Амброзия	-	-	-	-	4-6	7.5 см
Пастушья сумка⁽⁴⁾	-	-	до 6	10 см	6-10	15 см
Большой красный сорняк⁽⁵⁾	-	-	4-6	15 см	6-10	15 см
Сенна	-	-	-	-	до 1 кущения	5 см
Сесбания	-	-	-	-	3-5	7.5 см
Сида	-	-	до 6	7.5 см	6-8	10 см
Подсолнух	до 2	7.5 см	до 4	12.5 см	4-6	-

Донум = 1000 м²

- (1) Если происходит разрастание сорняков, повторить обработку 140 мл / Донум каждые 7-14 дней.
- (2) Лечение проводить при указанном в таблице количестве листов, и не считайте листья семядолей.
- (3) Если происходит повторное разрастание сорняков, провести обработку с указанной нормой расхода каждые 7-10 дней.
- (4) Не обрабатывайте розетку перед появлением стебля.
- (5) Для восстановления роста или нового прорастания, необходимо регенерировать с БЛАСТ-44.1%.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РИСА:

- Норма расхода 210 - 285 мл / Донум.
- Максимальная высота над почвой (10-38 см).
- Диапазон высоты над уровнем воды (5 - 25 см).
- При повторном росте или новом прорастании, при необходимости использовать респиратор с БЛАСТ-44.1%.

ВНИМАНИЕ:

- Используется только на вышеупомянутых культурах.
- Перед применением провести калибровку распылителя.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить животных на обработанном участке в течение 12 дней.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 24 часа после последней обработки.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, за исключением щелочных соединений. Перед применением рекомендуется провести тест на совместимость.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**