

CIPROTRIL ЦИПРОТРИЛ

Пероральный раствор

VARCO
АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Ципрофлоксацин

100 мг

СВОЙСТВА:

- Эффективный антибиотик, который относится к группе фторхинолонов.
- Характеризуется быстрой абсорбцией и быстрым увеличением уровня сыворотки в крови.
- Эффективен против широкого спектра бактерий и микоплазм.

ПОКАЗАНИЯ:

Птица, индейка: хронические респираторные инфекции, септицемия *E. Coli*, острый ринит, холера у птиц, синусит, хронических респираторных заболеваниях, брюшной тиф, сальмонеллезе (*S. typhimurium*, *S. enteritidis* и т.д.), Стафилококковые и Стрептококковые инфекции, инфекции омефалита и желточного мешка, микоплазмоз и инфекцию индейки, вызванную *Erysipelothrix* (рожистое воспаление).

Телята, ягнята, дети: инфекции дыхательных путей (*Pasteurella*, *Mycoplasma*), энтерит, дизентерия, диарея у новорожденных и молодых особей, вызванная (*Colibacillosis*, *Salmonellosis*) и гемофильной инфекцией, кроме того, инфекции мочеполовых путей.

Кролики: Пастереллез, энтеротоксикоз, энтерит, дизентерия, инфекции дыхательных путей.

Поросята: инфекции мочеполовой системы и дыхательных путей, диарея и энтерит новорожденных, вызванные бактериями, такими как: *E. coli*, *Salmonella* и т. д.

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для орального применения с водой для питья.
- Для лечения (продолжительность в течение 3-5 дней):
- **С/х птицы, куры, индюки:** 100 мл препарата на 200 литров питьевой воды.
- **Крупный рогатый скот, овцы, козы, телята, ягнята, свиньи, кролики:** 0.3-0.5 мл на 10 кг массы тела с водой в день.
- **Для профилактики:** Половина дозы на этот период.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- **Мясо:** Для потребления мяса: 7 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время лечения не принимать лекарство, содержащее минеральными препаратами.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30°C

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) мл.