

СОСЦИДОЛЕ

КОКЦИДОЛ

Кормовая добавка ПОРОШОК

VARCO

ПРОТИВОКОКЦИДИОЗНЫЕ

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Клопидол

125 мг

СВОЙСТВА:

- Клопидол (группа пиридинола) действует на шизонты кокцидий первого поколения и, таким образом, предотвращает возникновение заболевания.
- Он не обладает иммунитетом против кокцидиоза. Нетоксичен для видов, не являющихся хозяевами, очень безопасен для использования и совместим с другими медикаментами, включая антибиотики, поэтому его можно вводить с другими медикаментами, за исключением других антикокцидиальных средств.
- Помогает и улучшает обмен веществ, способствует росту и повышает производительность, конверсию корма и увеличение веса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Для профилактики и лечения большинства видов штаммов *Eimeria* spp., вызывающих оцекальный и кишечный кокцидиоз у домашней птицы, кроликов, индюков и дичи (куропатки, фазаны).

ДОЗИРОВКА:

- **Профилактика:** начать лечение стада в суточном возрасте
 - **Птица:** 1 кг на тонну корма непрерывно до 16 недель.
 - **Кролики:** 1,6 кг на тонну корма непрерывно.
 - **Индюки:** 800 г на тонну корма непрерывно до 12 недель.
 - **Дичь:** 1 кг на тонну корма непрерывно.
- **Лечение:** в зависимости от тяжести случая удвоить профилактическую дозу до 2-4 раз в течение 2-4 дней, затем вернуться к профилактической дозе.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Не рекомендуется использовать для кур-несушек.
- Не смешивать с другими антикокцидиальными средствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Настоятельно рекомендуем использовать Неомицин или Колистин (600, 80) в течение 3-5 дней вместе с Кокцидол для лечения вторичной инфекции кишечника, вызванной кокцидиозом.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: для потребления мяса: 7 дня.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С

УПАКОВКА: (1, 5, 10, 25) кг.