

# كوكسيديول

بودرة

التركيب: كل غم يحتوي على:

125 ملغم

كلوبيديول

## الخواص:

- الكلوبيديول (مجموعة البايروبيول) والتي تؤثر على المراحل الاولى للاتزاوجية (الشيزونت) في دورة حياة الكوكسيديا مما يمنع حدوث المرض.
- لا يؤدي الى ظهور المناعة والمقاومة ضد هذه الاصابة، كما انه مامون الاستعمال، ويمكن استخدامه مع العلاجات الاخرى والصادات الحيوية وغيرها باستثناء ادوية الكوكسيديا الاخرى.
- يعمل على تحسين الاستقلاب ومعدلات التحويل الغذائي والاداء وزيادة الوزن.

## الإستطبابات:

- للمعالجة و الوقاية من اصابات الكوكسيديا الاعورية والمعوية في الدواجن وطيور الحبش (الرومي) والارانب والطيور البرية (الفران والحجل ودجاج غينيا).

## الجرعات :

### الوقاية:

- يبدأ استعمال العلاج من اليوم الاول لعمر القطيع.
- الدواجن: 1 كغم لكل طن علف وحتى عمر (16) اسبوعاً.
- الارانب: 1.6 كغم لكل طن علف وباستمرار.
- طيور الحبش (الرومي): 800 غم لكل طن علف وحتى عمر (12) اسبوعاً.
- الطيور البرية: 1 كغم لكل طن علف وباستمرار.

### المعالجة:

- يمكن مضاعفة جرعة الوقاية حتى 2-4 مرات ولمدة 2-4 أيام، وذلك حسب شدة الإصابة ثم العودة مرة أخرى الى جرعة الوقاية.

## تنبيهات :

- لا يعطى للقطعان البيضاء.
- لا يعطى مع علاجات الكوكسيديا الاخرى.

## فترة الامان :

- لاستهلاك اللحوم: اسبوع.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (1، 5، 10، 25) كغم.