

# COPPER SULPHATE

## СУЛЬФАТ МЕДИ

(Синий купорос, Синий камень)

Растворимый в воде порошок

Вяжущие, антисептическое, грибковое, альгегцидное, моллюскицидное, каустическое и гемостатическое средство.

**VARCO**  
**СМЕШАННЫЕ**

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- При ранах и язвах: 0,1-5% антисептический раствор.
- Ванна для ног: 5-10% раствор два раза в день для профилактики и лечения гниения стопы у овец и крупного рогатого скота.
- Предотвращение пост-погружающейся хромоты у овец: к погружной ванне добавляют 0,03% раствора.
- В сочетании с сульфатом железа и сульфатом цинка: использовать перевязочный материал в случае ранения ног у лошадей (0,5: 1: 1 соответственно).
- При пролиферативном дерматите, чрезмерной грануляции тканей, непаразитарной экземе и дерматозе: 0,1-2%.
- Каустический порошок для бородавок.
- Язвенные раны на коже и некротические поражения: сначала удалить мертвые ткани и обломки, затем пыль, использовать концентрацию 5 ррт два раза в день.
- Повреждения ног при болезни ящура: промыть дезинфицирующим раствором, затем нанести смесь сульфата меди и смолы (1: 100) соответственно.

### ВНУТРЕННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- В случаях суровой чистки крупного рогатого скота из-за избытка молибдена в пастбищной траве: давать ежедневно 2 г / корову и 1 г / молодняк в течение одной недели, в период выпаса в качестве пропитанной или диетической добавки.  
Не дают телятам, находящимся на молоке или заменителях молока.
- Профилактика патологического усиления поясничного лордоза у ягнят: дается сульфат меди беременным овцам в пострадавшие районы:  
На животное (1,5 г) через 8 недель, а затем в (4) недели до ламбирования.
- В областях с дефицитом меди: быстро добавляют 0,5% к соли.
- Кролики: для улучшения показателей роста и анаболического эффекта: 200 частей на миллион в корме.
- Кормовая добавка в качестве усилителя продукции для молочного скота и коз:  
- Смешать 250 г / кг корма, затем дать дозу (0,5-2 г) смеси на животное.
- Случаи аспергиллеза у цыплят, трихомониаза и гексамитиаза у индюков.

(Раствор 1: 2000 с питьевой водой в течение 3-5 дней).

- Трихомониаз у страуса: 500-750 мг / литр питьевой воды или 1 г на кг корма.
- Используется в качестве перорального противоядия при отравлении фосфором, который действует, образуя нерастворимый осадок, когда он представлен как (0,2-1%) раствор.

**Другие виды использования:**

- Фунгицидное и альгицидное: (0,5-1) мг / литр воды для водоемов, прудов, погружных ванн и бассейнов.
- Мощный моллюскацид для уничтожения пресноводных улиток (которые действуют как промежуточные хозяева для печеночных сосальщиков и шистосомоза): Смешать медный сульфат с песком (1: 4 части соответственно) и обработать пострадавшие районы (4 кг / 1000 квадратных метров), достаточно два раза в год.

**ВНИМАНИЕ:** Токсично, сильно раздражает кожу и слизистые оболочки.

**МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ:**

- Яйцо (белок), молоко, магний, и другая терапии.
- Na-Ca-эдетат можно использовать для хелатной меди.

**ХРАНЕНИЕ:**

- Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °C.
- Беречь от детей.

**УПАКОВКА:** (500, 1000) г.