

سايبروتريل

محلول للشرب

التركيب: كل مل يحتوى على:-

100 ملغم

سيبروفلوكساسين

الخواص:

- الصاد البكتيري الفعال ، مقاوم الانتانات الخمجية والذي ينتمى الى مجموعة الفلوروكينولون.
 - يتميز بسرعة امتصاصه وتركيزه العالي في مصل الدم.
- فعالية واسعة الطيف ضد كثير من البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية ، والمايكوبلازما.

الاستطبابات:

- الدواجن: الرشح المزمن و الكولاي و كوليرا الطيور و التهاب التجاويف الانفية و التهاب الاكياس الهوائية والرشح المعدي(كورايزا) واصابات السالمونيلا المختلفة والمكورات العنقودية والعقدية والمايكوبلازما والتهاب السرة وكيس الصفار واصابات الايريسبلوثريكس في الحبش (الرومي).
- العجول والحملان والسخول: امراض الجهاز التنفسي المتسببه عن (الباستريلا والمايكويلازما) والنزلات المعوية وزحار الفبريو (الدوزنتاريا) والاسهالات في المواليد والحيوانات النامية والمتسببة عن بكتيريا (الكولاي والسالمونيلا) واصابات الهيموفيلوس جاليناروم وامراض الجهازين التنفسي والبولي التناسلي.
- الارانب: اصابات الباستريلا والانتروتوكسيميا والاسهالات والنزلات المعوية وزحار الفبريو (الدوزنتاريا) وامراض الجهازين النتفسي والبولي النتاسلي.
- الخنازير: امراض الجهازين التنفسي والبولي النتاسلي والاسهالات والنزلات المعوية في المواليد المتسببة عن بكتيريا (الكولاي والسالمونيلا وغيرها).

الجرعات: (لمدة 3-5 ايام).

- المعالجة:
- الدواجن وطيور الحبش (الرومي): 100 مل لكل 200 لتر من ماء الشرب.
 - العجول والحملان والسخول والارانب والخنازير:
 - 0.5-0.3 مل /10 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب.
 - (3-5 ملغم فعالية لكل كغم وزن جسم).
 - الوقاية: نصف الجرعة المعلاجية وللمدة نفسها.

فترة الأمان: * لاستهلاك اللحوم: أسبوع.

تنبيه:

■ يجب عدم اضافة الاملاح المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.