

سايكو - س

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:

320 ملغم	سلفاديميدين صوديوم
10 ملغم	ديافريدين هيدروكلوريد

الخواص:

- تركيبة مشتركة وفعالة من صادات الكوكسيديا والبكتيريا.

الإستطبابات:

- للوقاية ومعالجة السالمونيلا والكوكسيديا بأنواعها المختلفة (ايميريا تينلا، ايميريا نيكاتركس، ايميريا برنييتي، ايميريا ماكسيما، ايميريا اسرفولينا، ايميريا هاجني، ايميريا ميتس، ايميريا ميفاتي، ايميريا بريكوكس) المعوية والأعوية والكبدية في الدواجن وطيور الحبش (الرومي) والأرانب.

الجرعات:

- الدواجن والحبش (الرومي): 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة ثلاثة ايام متتالية، ثم يعطى الماء فقط لمدة يومين متتالين، ثم تستمر المعالجة خلال اليومين التاليين.
- الأرانب: 1 غم لكل 4 لترات من ماء الشرب لمدة 3-5 ايام.
- بواسطة العلف: 2 كغم لكل طن من العلف ولمدة ثلاثة ايام.
- في الحالات الشديدة يمكن مضاعفة الجرعة ولمدة نفسها.

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: اسبوع.

تنبيهات:

- يستعمل للدواجن اللحم فقط.
- اثناء المعالجة، يجب تزويد القطعان بكميات كافية من ماء الشرب، تجنباً لتبلور وترسب السلفا في جسم الحيوان.
- في حالة استعماله في الدجاج البياض، يلاحظ انخفاض اعداد البيض في القطيع طوال فترة الاستعمال.
- يوصى باستعمال العلاجات (نيومايسين أو كولستين - 600) لمدة 3 - 5 ايام (طوال فترة الإصابة).

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م°.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.