

DEWORMER

ДИВОРМЕР

Пероральная суспензия

Глистогонное средство для овец, коз, крупного рогатого скота, верблюдов, лошадей.

VAPCO

АНТИГЕЛЬМИНТЫ

Состав: Каждый мл содержит:

Фенбендазол

50 мг

СВОЙСТВА:

- Фенбендазол обладает широким спектром антигельминтного действия;
- активен в отношении взрослых форм, личинок и яиц нематод желудочно-кишечного тракта и легких, а также цестод.

ПОКАЗАНИЯ:

Для лечения и контроля паразитарного гастроэнтерита и паразитарного бронхита.

- Овцы, козы, крупный рогатый скот, верблюды:
 - Желудочно-кишечные круглые черви: *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Haemonchus*, *Strongyloides*, *Nematodirus*, *Cooperia*, *Bunostomum*, *Oesophagostomum*, *Marshallagia*, *Chabertia* ...
 - Легочные черви: *Dictyocaulus*, *Muellerius*.
 - Ленточные черви: *Moniezia*.
- Коней: Мелкие и крупные виды червей *Strongyles*, *Oxyuris*, *Ascarids*, *Trichostrongylus*, *Strongyloides*

ДОЗИРОВКА: (разовая доза).

- Перед использованием хорошо встряхнуть.
- Овцы, козы: 1 мл / 10 кг массы тела. (5 мг / кг массы тела;.)
- Крупный рогатый скот, верблюды: 1,5-2 мл / 10 кг массы тела (7,5 мг / кг массы тела)

Для ленточных червей у крупного рогатого скота: 2 мл / 10 кг массы тела.

(активного вещества 10 мг / кг массы тела)

- Кони: 1-2 мл / 10 кг. (активного вещества 5 мг / кг массы тела)

Для аскарид в лошадях: 2 мл / 10 кг. (10 мг / кг массы тела)

Срок выведения препарата:

- Для потребления мяса: 14 дней.
- Для потребления молока: 3 дня.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- В случае повторной инфекции повторить лечение через 4-6 недель.
- Для лошадей может потребоваться регулярная дегельминтизация с интервалом в 6-8 недель.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °С.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) мл.