

DEWORMER – BOLUS

ДИВОРМЕР - БОЛЮС



СОСТАВ: Каждый болюс содержит:

Фенбендазол

100 мг

ПОКАЗАНИЯ:

Инфекция желудочно-кишечными нематодами, легочными и ленточными червями у крупного рогатого скота, буйволов, овец, коз, лошадей, собак и кошек, таких как *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Gairdia* spp., *Capillaria* spp., *Oesophagostomum* spp., *Chabertia* spp., *Trichuris* spp., *Strongyloides* spp., *Dictyocaulus* spp., *Toxascaris vitulorum*, *Moniezia* spp. Инфекция лошадей крупными и малыми видами *Strongylus*, *Parascaris equi*, *Oxyuris equi* и *Strongyloides* spp.

ДОЗИРОВКА:

- Для крупного рогатого скота, буйволов, овец, коз и лошадей:
100 мг болюса на 20 кг массы тела.
- Для собак и кошек:
один 100 мг болюса на 2 кг массы тела в течение 3 последовательных дней при мощности дозы 50 мг фенбендазола на кг массы тела.

Время выведения препарата:

- для потребления мяса: 14 дней
- для потребления молока: 3 дня

ПРИМЕЧАНИЯ:

- В случае повторной инфекции повторить лечение через 4-6 недель.
- Для лошадей может потребоваться регулярная дегельминтизация с интервалом в 6-8 недель.

ХРАНЕНИЕ: хранить в сухом, темном месте ниже 30 ° C

УПАКОВКА: 50 болюсов