

DIASOX ДИАКОКС

Водорастворимый порошок

VARCO

противококцидиозные

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Сульфадимидин Натрий
Диаверидин HCl

800 мг
80 мг

СВОЙСТВА:

- Высокоактивная и синергетическая комбинация антикокцидиальных и антибактериальных агентов.
- Эффективен против различных видов штаммов Eimeria (Acervulina, Necatrix, Tenella, Brunetti, Maxima, Meleagrimitis, Adenoides).
- Не оказывает неблагоприятного воздействия на производство яиц, рождаемость и рост.

ПОКАЗАНИЯ:

Для лечения сальмонеллеза, слепой кишки, печени и кишечника кокцидиоза у домашней птицы, индюшки, цесарок и уток.

ДОЗИРОВКА:

- **домашняя птица, индейки, цесарки:**
50 г на 200 литров питьевой воды в течение 5 дней подряд или лечить в течение 3 дней подряд, а затем давать простую воду в течение двух дней, после чего лечить в течение следующих 3 дней.
- **утки:** 100 г на 200 литров питьевой воды в течение 5 дней подряд или лечить в течение 3 дней подряд, после чего следует давать простую воду в течение двух дней, а затем лечить в течение следующих 3 дней.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Для потребления мяса: 14 дней.
- Для потребления яиц: 12 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обеспечить достаточное потребление воды во время лечения, чтобы уменьшить риск возникновения кристаллов.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Настоятельно рекомендуем использовать Неомидин или Колистин (600, 80) в течение 3-5 дней вместе с Диакос для лечения вторичной инфекции кишечника, вызванной кокцидиозом.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.