

DIAZINON-60%

ДИАЗИНОН-60%

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Класс:
Органофосфаты

Дезинфицирующий инсектицид с контактным, желудочным и респираторным действием против вредных и синантропных насекомых, которые влияют на здоровье населения: тараканы, комнатные мухи, комары, клопы, блохи и муравьи и др.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ДИАЗИНОН

60% вес / объем
(активного вещества)

СВОЙСТВА:

ДИАЗИНОН-60%: фосфорорганический инсектицид, оказывает контактное, желудочное и респираторное действие.

ДИАЗИНОН-60%: используется для борьбы с такими вредными насекомыми, как: тараканы, клопы, муравьи, вши, личинки мух, домашние мухи, блохи и клещи.

ДИАЗИНОН-60%: обладает длительным остаточным эффектом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА	ВНИМАНИЕ
* ПОВЕРХНОСТНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ		
Тараканы	100 – 200 мл / 20 л воды / 100 м ²	Распылять на зараженные участки, такие как плинтуса, участки вокруг водопроводных труб, внизу раковин, трещины, царапины, поверхности позади и под шкафами, холодильники и другие места, где прячутся насекомые. Повторять опрыскивание каждые 1-2 месяца, чтобы избежать повторного заражения.
Мухи и комары		Опрыскивать стены и потолки в помещении и другие поверхности, на которых отдыхают мухи и комары, находящиеся за пределами здания (веранды, карнизы, дома и т. д.)
Клопы и вши		Опрыскивать стены, рамы кроватей и под матрасами, а также под мягкой мебелью. Следует

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**

		обратить особое внимание на трещины, царапины, заднюю часть картин, окна и дверные проемы.
Чешуйницы		---
Муравьи	150 мл / 20 л воды / 100 м ² (можно добавить 100 г сахара к 4 - 5 л смеси спрея).	Обрабатывают влажные муравейники и взлетно-посадочные полосы (дорожки), применяют при обработке входных дверей и оконных рам, трещин в стенах.
* ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ (ГОРЯЧИЙ ТУМАН ИЛИ УЛЬТРАМАЛЫЙ ОБЪЕМ (ULV)):		
Комары	330 – 660 мл / 2 – 10 л дизель / Га.	Обработка площадей против взрослых комаров должна регулярно проводиться на улицах, на рынках, в парках, на игровых площадках, на пляжах, в мусорных баках.
Мухи		Обработка площадей против взрослых мух должна регулярно проводиться на улицах, на рынках, в парках, на игровых площадках, на пляжах, в мусорных баках.
ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА	ВНИМАНИЕ
* ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ИЛИ ЛЕЙКИ:		
Личинки мух	30 мл / 10 л воды.	Ограничить обработку против личинок мух в тех случаях, когда рассадник распространения локализован и четко определен (навозные кучи, открытые уборные). Места размножения должны быть пропитаны распыляемой жидкостью. Наносить распыляемую смесь в виде грубого спрея или лейки. Применение должно повторяться с недельными интервалами.

Гектар = 10000 м²

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: через 48 часов после последней процедуры.

ОСТАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: Около 4-6 недель.

ВНИМАНИЕ: Избегать распыления **ДИАЗИНОН-60%**, если температура воздуха ниже -10 °C и выше +35 °C; площадь обработки не должна быть влажной.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.