

DO – CARB

ДО-КАРБ

Против простейших
Раствор для инъекций

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Имидокарб Дипропионат

120 мг

ПОКАЗАНИЯ:

- До-карб используется для борьбы с бабезиозом у крупного рогатого скота, овец, лошадей и собак.
- Он также используется для лечения и профилактики анаплазмоза у крупного рогатого скота и у собак Эрлихия инфекция.

ДОЗИРОВКА:

- Лечение:

• Крупный рогатый скот: (подкожная инъекция)

- При бабезиозе: 1 мл на 100 кг массы тела.
- При анаплазмозе или смешанной инфекции из-за анаплазмоза и бабезиоза: 2,5 мл на 100 кг массы тела.

• Овцы: (подкожная инъекция)

- При бабезиозе: 0,5 мл на 50 кг массы тела

• Кони: (путем внутримышечной или подкожной инъекции)

- При бабезиозе: 2 мл на 100 кг массы тела.

Повторная инфекция может потребовать 2 дозы с интервалом 24 часа.

• Собаки: (подкожная инъекция)

- При бабезиозе: 0,25 мл на 10 кг массы тела.
- При эрлихиозе или смешанной инфекции из-за эрлизиоза и бабезиоза: 0,5 мл на 10 кг массы тела давать 2 дозы с интервалом 14 дней.

- Профилактика:

Однократная доза предотвратит бабезиоз на срок до 4 недель.

• Крупный рогатый скот: 2,5 мл на 100 кг массы тела

• Кони: 2 мл на 100 кг массы тела.

• Собаки: 0,5 мл на 10 кг массы тела.

Внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Не вводить внутривенно.
- Не следует комбинировать с ингибиторами холинэстеразы или пестицидами.
- Не использовать для кормящих животных.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса: 28 дней.

ХРАНЕНИЕ: хранить в сухом, темном месте ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.