

DOXYVAR ДОКСИВАП

Водорастворимый порошок

VARCO
АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Доксициклин HCl

200 мг

СВОЙСТВА:

- Доксициклин (группа тетрациклина) антибиотик широкого спектра действия; быстро абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, широко распространяется по всему телу и выводится медленнее, чем другие тетрациклины.
- Доксициклин является антибиотиком длительного действия и является безопасным средством даже при лечении с нарушенной функцией почек. Он быстро всасывается в кишечнике и медленно выводится из организма.
- Доксициклин используется в случаях различных инфекций дыхательных, урогенитальных и желудочно-кишечных трактов; инфекции могут быть вызваны микоплазмой и различными грам-положительными и грам-отрицательными бактериями (Staph, Strept, Coli, Chlamydia, Clostridia, Rickettsia, Vibrio, Campylobacter, Pasteurella, Leptospira, Spirochaeta, Pseudomonas, Listeria, Shigella, Klesbsiella и т. д.)

ПОКАЗАНИЯ:

- Применяют для лечения домашней птицы, телят, ягнят, козлят, собак, кошек, голубей, птицам в клетках и свиней.
- Для лечения и профилактики различных заболеваний: хронические респираторные инфекции, острый ринит, микоплазмоз, воздушный суккулит, синусит, синовит, колибациллез, омфалит и желчный мешочек, холера у птиц, некротический энтерит (Clostridia) и различные бактериальные энтериты и диарии.

ДОЗИРОВКА: (Продолжительность лечения: 4-5 дней)

- **Лечение:**
 - **Птица:** 100 г / 200 литров питьевой воды.
 - **Голуби, птицы в клетке:** 0,65 г / л питьевой воды.
 - **Разные животные (жвачные животные) и свиньи:** 0,5 г / 10 кг массы тела ежедневно с водой.
- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Для потребления мяса: телята, ягнята, козлята: 14 дней

Свиньи: 8 дней

Птица: 5 дней

- Для потребления яиц: 4 дня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время лечения минеральные соли не следует добавлять в лечебную воду.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30°C

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.