

دو - كارب

مضاد لطفيليات الدم

محلول للحقن

التركيب: كل مل يحتوي على:

120 ملغم

اميدوكارب دايبروبيونات

الاستطبابات:

- لمعالجة الأمراض الناتجة عن البابيزيا في الأبقار والضأن والخيول والكلاب.
- لمعالجة والوقاية من الانابلازما في الأبقار.
- لمعالجة والوقاية من الإبرليخيا في الكلاب.

الجرعات:

العلاج:

- الأبقار: (حقنا تحت الجلد).
 - لعلاج البابيزيا: 1 مل لكل 100 كغم وزن حي.
 - لعلاج الانابلازما أو الإصابات المختلطة الناتجة عن الانابلازما والبابيزيا: 2.5 مل لكل 100 كغم وزن حي.
- الضأن: (حقنا تحت الجلد)
 - لعلاج البابيزيا: 0.5 مل لكل 50 كغم وزن حي.
- الخيول: (حقنا بالعضل أو تحت الجلد)
 - لعلاج البابيزيا: 2 مل لكل 100 كغم وزن حي.
 - في حالة البابيزيا الكوي تعطى جرعتين تفصل بينهما 24 ساعة.
- الكلاب: (حقنا تحت الجلد)
 - لعلاج البابيزيا: 0.25 مل لكل 10 كغم وزن حي.
 - لعلاج الإبرليخيا أو الإصابات المختلطة الناتجة عن الإبرليخيا والبابيزيا: 0.5 مل لكل 10 كغم وزن حي تعطى جرعتين الفاصل بينهما 14 يوم.
- الوقاية: جرعة واحدة لها تأثير وقائي ضد البابيزيا يمتد لفترة تصل الى 4 أسابيع.
 - الأبقار: 2.5 مل لكل 100 كغم وزن حي.
 - الخيول: 2 مل لكل 100 كغم وزن حي.
 - الكلاب: 0.5 مل لكل 10 كغم وزن حي.

تنبيهات:

- لا يعطى بالوريد
- لا يستخدم مع مثبطات الكولين استريز او مع المبيدات.
- لا يعطى للحيوانات الحلوب.

فترة الأمان:

- لاستهلاك اللحوم : 28 يوماً.

التخزين : يحفظ في مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبدرجة حرارة أقل من 30° م.

العبوات: (50، 100) مل.