

ERYTHRODONE ЭРИТРОДОН

Раствор для инъекций

Для овец, коз, крупного рогатого скота, свиней

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Эритромицин Тиоцианат	100 мг
Лидокаин гидрохлорид	50 мг

СВОЙСТВА:

- **Эритромицин**, макролидный антибиотик широкого спектра действия, обладает исключительной терапевтической эффективностью и безопасностью.
- Высоэффективен против грам-положительных и грам-отрицательных бактерий: Staph, Sterpt, Pneumococci, Pasteurella, Haemophilus, Brucella, Mycoplasma, Listeria, Rickettsia, Clostridia, Campylobacter, Enterococci, Erysipelothrix.
- Он уменьшает вирулентность бактерий, даже тех, которые не входят в его спектр активности.

ПОКАЗАНИЯ:

- Инфекции дыхательных путей:
Трахеит, бронхит, бронхопневмония, пневмония, ринит.
- Инфекции желудочно-кишечного тракта:
Энтерит, дизентерия баранины (Клостридия), перитонит, ретикуло-перитонит.
- Инфекции мочевыводящих путей:
Нефрит, пиелонефрит, цистит, метрит, вагинит.
- Мастит (поддерживающее лечение), гниль на ногах, микоплазмоз, лихорадка, сепсис, лептоспироз, пьямия, эритроциты, вибриоз.
- Кожные инфекции: пиодермия, фурункулез, абсцессы.

ДОЗИРОВКА:

Глубокая внутримышечная инъекция:

Крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи: 1 мл / 20 кг массы тела дается один или два раза в день в течение 2-3 дней.

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Каждый раз необходимо менять место инъекции; дозу можно разделить.

- После инъекции может возникать временное местное раздражение (в течение нескольких дней).
- Не назначать с пенициллинами.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:• Для потребления мяса: 7 дней.
• Для потребления молока: 3 дня.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.