

ERYXIN ЭРИКСИН

Водорастворимый порошок

Для птицы, индейки, телят, ягнят, козлят

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Эритромицин Тиоцианат	350 мг
Бромгексин HCL	10 мг

VAPCO
АНТИБИОТИКИ

СВОЙСТВА:

- Эритромицин, макролидный антибиотик, безопасен и очень активен против грам-положительных и грам-отрицательных бактерий, таких как: Staph. Strept., Coryne, E.Coli, Pasteurella, Mycoplasma, Pneumococci, Haemophilus, Erysipelothrix и т.д.
- Бромгексин является эффективным муколитическим отхаркивающим средством для лечения и контроля нарушений дыхательных путей, связанных с чрезмерными слизистыми выделениями; делает их менее вязкими и легко удаляет из дыхательных путей.

Это также усиливает проникновение эритромицина в секрецию бронхов.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для профилактики и лечения хронических респираторных инфекций, микоплазмоза, насморка, инфекционный синусит, воздушный суккулит, инфекционный синовит, вибрионный гепатит.
- Поддерживающее лечение при респираторных вирусных заболеваниях и клостридиальных инфекциях.
- Условия стресса, вызванные вакцинацией, дебакированием, транспортировкой, перемещением, изменениями корма и погодой.

ДОЗИРОВКА:

- **Лечение:** (немедленно использовать раствор).
 - (Перед добавлением в питьевую воду сделать предварительный раствор продукта 1 кг на 60 литров воды температурой 60 ° C)
 - **Домашняя птица, индейка:** 100 г на 200 л питьевой воды в течение 3-5 дней..
 - **телята, ягнята, козлята:** 0,3-0,7 г / 5 кг массы тела один или два раза в день (в зависимости от тяжести случая), перорально с водой в течение 5 дней.
(20-50 мг эритромицина / кг массы тела).

- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса и яиц: 7 дней.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30°C

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.