

# انروسول - 20 %

محلول

التركيب: كل مل يحتوي على:-

200 ملغم

انروفلوكساسين

## الخواص:

- الصاد البكتيري الفعال مقاوم للانتانات الخمجية والذي ينتمي إلى مجموعة الفلوروكينولون.
- يتميز بسرعة امتصاصه وتركيزه العالي في مصّل الدم.
- فعالية واسعة الطيف ضد كثير من البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية والمايكوبلازما.

## الإستطبابات:

- **الدواجن:** الرشح المزمّن والكولاي والرشح المعدي (الكورايزا) وكوليرا الطيور وتيفوئيد الطيور واصابات السالمونيلا الاخرى (تيفيموريوم ، انترتيدس وغيرها) واصابات المكورات العنقودية والعقدية والمايكوبلازما والتهاب السرة وكيس الصفار ، واصابات ايريسبلوثريكس في طيورالحبش (الرومي) .
- **العجول والحملان والسخول :** أمراض الجهاز التنفسي المتسببة عن (الباستريلا والمايكوبلازما) والنزلات المعوية وزحار الفبريو (الدوزنتاريا) والاسهالات في المواليد والحيوانات النامية والمتسببة عن بكتيريا (الكولاي والسالمونيلا) .
- **الأرانب:** إصابات الباستريلا والانثروتوكسيميا والاسهالات والنزلات المعوية وزحار الفبريو (الدوزنتاريا) وأمراض الجهاز التنفسي.
- **الخنزير:** أمراض الجهاز التنفسي والاسهالات والنزلات المعوية في المواليد والمتسببة عن بكتيريا (الكولاي والسالمونيلا وغيرها).

## الجرعات:

### ■ المعالجة:

#### • الدواجن:

50 مل / 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 أيام.

(في حالات السالمونيلا تستمر المعالجة ليومين إضافيين).

- **العجول والحملان والسخول والأرانب والخنزير:** (3-5 ملغم فعالية / كغم وزن جسم) .

0.15-0.25 مل / 10 كغم وزن جسم يومياً مع الماء لمدة 3 - 5 أيام.

- **الوقاية:** نصف الجرعة العلاجية وللمدة نفسها.

**فترة الأمان:** \* لاستهلاك اللحم: أسبوع .

**التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م° .

**العبوات:** (100، 250، 500، 1000) مل.