

انروسول - ب

بودرة قابلة للانتشار في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

100 ملغم

انروفلوكساسين

الخواص:

- الصاد البكتيري الفعال مقاوم للانتانات الخمجية والذي ينتمي إلى مجموعة الفلوروكينولون.
- يتميز بسرعة امتصاصه وتركيزه العالي في مصّل الدم.
- فعالية واسعة الطيف ضد كثير من البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية والمايكوبلازما.

الإستطبابات:

- **الدواجن:** الرشح المزمّن والكولاي والرشح المعدي (الكورايذا) وكوليرا الطيور وتيفوئيد الطيور واصابات السالمونيلا الاخرى (تيفيموريوم، انترتيدس وغيرها) واصابات المكورات العنقودية والعقدية والمايكوبلازما والتهاب السرة وكيس الصفار، واصابات ايريسبلوثريكس في طيور الحبش (الرومي).
- **العجول والحملان والسخول:** أمراض الجهاز التنفسي المتسببة عن (الباستريلا والمايكوبلازما) والنزلات المعوية وزحار الفبريو (الدوزنتاريا) والاسهالات في المواليد والحيوانات النامية والمتسببة عن بكتيريا (الكولاي والسالمونيلا).
- **الأرانب:** إصابات الباستريلا والانتروتوكسميا والاسهالات والنزلات المعوية وزحار الفبريو (الدوزنتاريا) وأمراض الجهاز التنفسي.
- **الخنزير:** أمراض الجهاز التنفسي والاسهالات والنزلات المعوية في المواليد والمتسببة عن بكتيريا (الكولاي والسالمونيلا وغيرها).

الجرعات: (يتم تحريك المزيج جيداً قبل الإستعمال).

■ المعالجة:

• الدواجن:

100 غم / 200 لتر من ماء الشرب لمدة ثلاثة أيام.

(في حالات السالمونيلا تستمر المعالجة ليومين إضافيين).

• **العجول والحملان والسخول والأرانب والخنزير:** (3-5 ملغم فعالية / كغم وزن جسم).

0.3-0.5 غم / 10 كغم وزن جسم يومياً مع الماء لمدة 3-5 أيام.

■ **الوقاية:** نصف الجرعة العلاجية وللمدة نفسها.

فترة الأمان: * لاستهلاك اللحم: أسبوع.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.