

# أنروسول - س

محلول

التركيب: كل مل يحتوي على:-

100 ملغم

أنروفلوكساسيين

الخاص:

- الصاد البكتيري الفعال مقاوم للانتانات الخمجية والذي ينتمي إلى مجموعة الفلوروكينولون.
- يتميز بسرعة امتصاصه وتركيزه العالي في مصل الدم.
- فعالية واسعة الطيف ضد كثير من البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية والمایكوبلازما.

الإستطبابات:

- الدواجن: الرشح المزمن والكولي والرشح المعدي (الكورايزا) وكوليرا الطيور ونيفوتيد الطيور واصابات السالمونيلا الاخرى (تيفيمبوريوم ، انترتيس وغیرها) واصابات المكورات العنقودية والعقدية والمایكوبلازما والتهاب السرة وكيس الصفار ، واصابات اپریسبلوفٹریکس في طيور الحبش (الرومی).
- العجول والحملان والسمخول : أمراض الجهاز التنفسى المتنسبية عن (الباستريلا والمایكوبلازما) والنزلات المعاوية وزحار الفبريو (الدوزنتریا) والاسهالات في المواليد والحيوانات النامية والمتنسبية عن بكتيريا (الكولي والسالمونيلا).
- الأرانب: إصابات الباستريلا والانترونوكسيميما والاسهالات والنزلات المعاوية وزحار الفبريو (الدوزنتریا) وأمراض الجهاز التنفسى.
- الخنازير: أمراض الجهاز التنفسى والاسهالات والنزلات المعاوية في المواليد والمتنسبية عن بكتيريا (الكولي والسالمونيلا وغیرها).

الجرعات:

المعالجة:

• الدواجن:

100 مل / 200 لتر من ماء الشرب لمدة ثلاثة أيام.

(في حالات السالمونيلا تستمر المعالجة ليومين إضافيين).

• العجول والحملان والسمخول والأرانب والخنازير: (3-5 ملغم فعالية / كغم وزن جسم).

0.5-0.3 مل / 10 كغم وزن جسم يومياً مع الماء لمدة 3-5 أيام.

الوقاية: نصف الجرعة العلاجية وللمدة نفسها.

فترة الأمان: \* لاستهلاك اللحوم: أسبوع .

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°C.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.