

# إرثرودون

محلول للحقن

للضأن والماعز والأبقار والخنازير

التركيب: كل مل يحتوي على:

100 ملغم	ارثرومايسين ثيوسياتيت
50 ملغم	ليدوكين هيدروكلورايد

## الخواص:

- الصاد البكتيري ارثرومايسين (مجموعة الماكرولايد) مأمون الاستعمال، وذو فاعلية واسعة الطيف.
- فعال ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية: المكورات العنقودية والعقدية والمكورات الرئوية والباستريلا والهيموفيلوس والبروسيلا والليستيريا والمايكوبلازما والركتسيا والكلوستريديا والكامبيلوباكتر والمكورات المعوية والاريسيلوثرريكس.
- يخفف من ضراوة البكتيريا وخاصة تلك التي لا تدخل في مدى فعاليته.

## الاستطبابات:

- اصابات الجهاز التنفسي:  
التهاب القصبات و الشعيبات الهوائية و الالتهاب الرئوي والرشح والمايكوبلازما.
- اصابات الجهاز الهضمي:  
النزلات المعوية ودوزنتاريا الحملان والتهاب الغشاء البريتوني.
- اصابات الجهاز البولي التناسلي:  
التهابات الكلى والمثانة البولية و الرحم والمهبل.
- المعالجة الداعمة لالتهاب الضرع.
- حمى الشحن (الباستريلا) والتسمم الدموي واللبتوسبيريا وتعفن الطلف والفريو والتسمم الدموي الصيدي والاريسبلاس.
- إصابات الجلد المتقيحة و الخراج.

الجرعات : تعطى حقناً عميقاً في العضل.

- الضأن والماعز و الأبقار والخنازير: 1 مل /20 كغم وزن جسم، ويعطى مرة أو مرتين في اليوم ولمدة 2-3 أيام.

## فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: اسبوع.
- لاستهلاك الحليب: ثلاثة ايام.

## تنبيهات:

- من المفضل تغيير مكان الحقن في كل مرة، كما يمكن تقسيم الجرعة.
- احتمال حدوث تهيج تقاعلي موضعي لبضعة أيام.
- لايعطى مع البنسلينات خوفاً من التداخلات الدوائية الضارة.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (50، 100) مل.