

إريكسين

بودرة قابلة للذوبان في الماء
للدواجن والحش والعجول والحملان والسخول

التركيب: كل غم يحتوي على:-

350 ملغم	ارثرومايسين ثيوسياتيت
10 ملغم	برومهكسين هيدروكلورايد

الخواص:

- الصاد البكتيري ارثرومايسين (مجموعة الماكرولايد) مأمون الاستعمال وشديد الفعالية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية والسلبية: المكورات العنقودية والعقدية والكورين والكولاي والباستريللا والمايكوبلازما والمكورات الرئوية والهيوفيلوس جاليناروم والاريسبلوثرريكس وغيرها.
- البرومهكسين: وهو مادة مذيبة مقشعة للإفرازات المخاطية الكثيفة والمصاحبة لإصابات الجهاز التنفسي، حيث يعمل على إذابتها وتقليل لزوجتها وكثافتها مما يسهل طردها من الشعبات والقصبات الهوائية، هذا بالإضافة إلى أنه يعزز من قدرة الإيثرومايسين على اختراق تلك الإفرازات المخاطية، مما يزيد من تأثيره ضد البكتيريا المسببة للمرض.

الإستطبابات:

- للوقاية والمعالجة من الرشح المزمن والمايكوبلازما والرشح المعدي (الكورايذا) والكولاي والكلاميديا والتهاب التجايف الأنفية والتهاب الأكياس الهوائية والنزلات المعوية والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل واصابات الجهاز التنفسي الاخرى المصحوبة بإفرازات مخاطية كثيفة.
- للمعالجة المساندة في حالات الأمراض التنفسية الفيروسية وإصابات الكلوستريديا.
- حالات الإجهاد الناتجة عن القاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الأحوال الجوية.

الجرعات:

- المعالجة: (يجب استعمال الحلول مباشرة).
- الدواجن وطيورالحبش (الرومي) : 100 غم / 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام.
- العجول الرضيعة والحملان والسخول : 0.3-0.7 غم لكل 5 كغم وزن جسم تعطى مرة او مرتين يومياً(حسب شدة الإصابة) مع ماء الشرب ولمدة 5 أيام.
- (20-50 ملغم ارثرومايسين / كغم وزن جسم).
- الوقاية: نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.
- فترة الأمان: * لاستهلاك اللحوم والبيض: أسبوع.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.