

FLORATONE-SL

ФЛОРАТОН-СЛ

Класс:
Synthetic auxin⁽¹⁾⁽²⁾

РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

ФЛОРАТОН-СЛ является регулятором роста растений, используемым для повышения плодородия и стимулирования роста растений.

СОСТАВ: Каждый литр содержит:

| | |
|--|-------------------------------------|
| АЛЬФА-НАФТИЛ УКСУСНАЯ КИСЛОТА (1) | 4,5 гр (активного вещества) |
| АЛЬФА-НАФТИЛ АЦЕТАМИД (2) | 12,5 гр (активного вещества) |

СВОЙСТВА:

ФЛОРАТОН-СЛ: представляет собой смесь регуляторов роста растений из семейства ауксина, который увеличивает плоды и улучшает урожайность.

ФЛОРАТОН-СЛ: Увеличивает действие других гормонов растений, которые улучшают здоровье и продуктивность растений.

ФЛОРАТОН-СЛ: При правильном использовании защищает растения от мороза и высокой температуры.

ФЛОРАТОН-СЛ: Совместим с большинством пестицидов и лиственных удобрений, кроме щелочных веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА мл/100 л ВОДЫ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|--------------------------------------|---|
| Фруктовые деревья: Яблоки, груши, персики, сливы, нектарин, абрикос. | 60 мл | Применять спрей в течение двух недель до цветения и повторно применять 2-3 раза каждые 10-12 дней; последнее применение осуществлять на стадии падения лепестков. |

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мер предосторожности.

| | | |
|---|-------|---|
| | 60 мл | Чтобы защитить плодовые деревья от мороза на стадии цветения, применять до увядания цветков от мороза. |
| Овощи: Помидор, кабачки, перец, баклажаны, арбуз, мускусная дыня, горох, фасоль, клубника. | 60 мл | Распылять до цветения, повторять процедуру каждые 10 дней. |
| | 60 мл | Способствует росту растений путем его применения на стадии образования двух-трех листов или через 10-15 дней после пересадки. |

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД: 8-12 дней, собирать урожай через 20 дней после обработки.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Не изменять скорость обработки и не увеличивать ее, поскольку эффект гормонов зависит от разницы в скорости подачи препарата.
- Не распылять при высоких температурах.
- Необходимо обрабатывать все части растений.
- Действие ФЛОРАТОН-СЛ зависит от условий окружающей среды.
- При использовании ФЛОРАТОН-СЛ растения не должны находиться в стрессовых условиях.
- Не рекомендуется распылять на огурцах.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством инсектицидов, фунгицидов и лиственных удобрений, несовместимых с другими регуляторами роста растений или с Бордо смесями.

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мер предосторожности.