

FOLDAN-50%

ФОЛДАН-50%

Class:
Phthalimide

ФУНГИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Защитный фунгицид с контактным действием, эффективен в борьбе с многими грибковыми заболеваниями для широкого диапазона сельхозкультур.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ФОЛПЕТ

50% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ФОЛДАН-50%: контактный фунгицид с лечебным и защитным действием.

ФОЛДАН-50%: эффективен для контроля многих грибковых заболеваний, таких как: ложная мучнистая роса, мучнистая роса, пятнистость листьев, парша и т. д.

ФОЛДАН-50%: Используется на широком ассортименте сельскохозяйственных культур, таких как семечковые деревья, косточковые деревья, цитрусовые, виноград, оливки, картофель, капуста, лук, помидоры, огурцы, баклажан и т. д.

ФОЛДАН-50%: Немного токсичен для млекопитающих и других полезных насекомых или диких животных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ	БЕЗОПАСНЫ Й ПЕРИОД
Груша	Парша, пятнистость листьев, мучнистая роса	50	10	21
Яблоко		40	Каждые 14 дней	21
Цитрусовые	Антракноз, отмирание, гоммоз	60	-----	21
Виноград	Ложная мучнистая роса, мучнистая роса, бурая гниль, отмирание.	60	Каждые 14 дней	8
Абрикос, слива, персик,	Курчавость листьев, антракноз, мучнистая роса,	50	3	10

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

миндаль	пятнистость листьев.			
Кустарники (голубика, смородина, крыжовник) Полукустанник (черника, разные сорта малины)	Серая плесень, пятнистость листьев	30 - 40	Опрыскивание проводить во время цветения. Повторять с интервалом 7-14 дней от цветения до сбора урожая. Использовать более высокую концентрацию, если условия способствуют появлению инфекции.	-----
КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД
Оливки	Павлиний глаз (пятнистость), увядание	30	-----	10
Тыква	Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, гниль стеблей, антракноз.	15	-----	7
Баклажаны, горох	Мучнистая роса, ранняя гниль, фитофтороз	30	-----	7
Бобовые	Мучнистая роса, пятнистость листьев	7 - 8	-----	10
Салат	Мучнистая роса, Серая плесень	40	Еженедельно	11
Мускусная дыня	Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, гниль стеблей, антракноз.	40	Еженедельно	7
Арбуз	Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, гниль стеблей, антракноз.	50	1 - 2	7
Лук	Розовая пятнистость, гниль.	40 - 50	2 - 3	7
Перец	Увядание, гниль стеблей, мучнистая	10 - 30	3 - 4	7

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

	роса.			
Картофель	Ранняя гниль, фитофтороз	60	Еженедельно	14
Помидоры	Ранняя гниль, фитофтороз	40	Еженедельно	14
Розы	Черная пятнистость, Мучнистая роса	40	Применить через регулярные промежутки времени от начала распускания почек	-----

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых сельхозкультурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.

ФИТОТОКСИЧНОСТИ:

Не фитотоксичен, за исключением: черешни, сорт груш D'Anjou и чувствительных сортов яблок, если применять на ранних этапах обрезки.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, кроме высокощелочных соединений. Использовать продукт сразу после смешивания.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.