

GENTA-PLUS

ГЕНТА – ПЛАС

Водорастворимый порошок
Для птицы, телят, ягнят, козлят

VARCO
АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Гентамицин сульфат	200 мг
Доксициклин HCl	200 мг

СВОЙСТВА:

ГЕНТА – ПЛАС представляет собой комбинацию двух антибиотиков с широким спектром антибактериального действия, включающим практически все патогенные микроорганизмы: хламидиоз, актиномицеты, риккетсия, микоплазма и крупные вирусы.

Гентамицин принадлежит к группе аминогликозидных антибиотиков и обладает антибактериальным действием. Спектр антибактериального действия этого препарата достаточно широк и охватывает как грам-положительные, так и грам-отрицательные бактерии в том числе: *Pseudomonas* spp., *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Serratia* spp., *E. Coli*, *Proteus* spp., *Salmonella* spp. и *Staphylococci*.

Доксициклин обладает бактериостатическим действием против большого числа грам-положительных и грам-отрицательных бактерий: *Staphylococcus* spp., *Haemophilus influenza*, *E.coli*, *Corynebacteria*, *Bacillus anthracis*, некоторые *Clostridium* spp., *Actinomyces* spp., *Brucella* spp., *Enterobacter* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp., и *Yersinia* spp. Доксициклин также проявляет активность против *Mycoplasma* spp., *Rickettsiae* и *Chlamydia* spp.. Безопасен при лечении животных с нарушенной функцией почек.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для профилактики и лечения различных инфекций дыхательных, пищевых и урогенитальных путей: хронические респираторные инфекции, насморк, микоплазмоз, синусит, синовит, колибациллез, птичья холера, сальмонеллез, спирохетоз, некротический энтерит (*Clostridia*), энтерит, кровавая диарея, вибрионная дизентерия и т.д.
- Снижение ранней смертности (из-за бактериальных инфекций) у недавно вылупившихся птенцов.
- Предотвращение ранней смертности новорожденных, очень молодых животных и отъемышей.

ДОЗИРОВКА: (Продолжительность лечения в течение 3-5 дней).

■ Лечение:

Птица: 50 г / 200 литров питьевой воды.

Телята, козлята, ягнята: 1-2 г / 20 кг массы тела дважды в день с водой.

- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Для потребления мяса: 7 дней
- Для потребления яиц: 2 недели.

ПРИМЕЧАНИЯ: Не назначается в случае нарушения почек.

Во время лечения минеральные соли не следует добавлять в лечебную воду.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30°C

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.