

GROUND – UP

ГРОУНД-АП

ГЕРБИЦИД

Класс:
Производные
глицина

РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Системный неселективный гербицид, предназначен для борьбы с большим разнообразием однолетних, двухлетних и многолетних трав, осоки, широколистных сорняков и древесных кустарников.

КОМПОЗИЦИЯ: Каждый литр содержит:

ГЛИФОСАТ ИЗОПРОПИЛАММОНИЯ	48% вес / объем (активного вещества)
(Эквивалентен глифосатной кислоте 36% вес / объем)	
БИО-АКТИВАТОР	17%

СВОЙСТВА:

ГРОУНД-АП: Специальная композиция содержит биоактиватор, который повышает его эффективность и снижает расход раствора до половины.

ГРОУНД-АП: Неселективный системный гербицид для борьбы с большим разнообразием однолетних, двухлетних и многолетних трав, широколистных сорняков и древесных кустарников.

ГРОУНД-АП: Полностью уничтожает сорняки, потому что поглощается непосредственно корнями.

ГРОУНД-АП: Безопасен для окружающей среды, потому что быстро разлагается под воздействием бактерий.

ГРОУНД-АП: Его действие и эффективность не зависят от низкой или высокой температуры.

ГРОУНД-АП: Не имеет предпосевного эффекта, поэтому растения следует высаживать после обработки почвы.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА / ДОНУМ	ИНТЕРВАЛ
Уничтожение предыдущего урожая и предварительная подготовка последующей культуры	250 - 350 мл/ 20 - 40 л воды	Провести опрыскивание, пока травы и сорняки достигают высоты 30-60 см и до периода цветения.
Деревья: для контроля многолетних трав и широколистных сорняков среди Фруктовых деревьев.	400 - 600 мл/ 10 - 50 л воды	Опрыскивать до периода цветения.
Несельскохозяйствен ные земли: для контроля однолетних и многолетних трав.	300 - 500 мл/ 10 - 50 л воды	---

Донум = 1000 м²

ВОДНЫЕ СОРНЯКИ:

Опрыскивание проводить, когда сорняки достигают в высоте 30 см, и до периода цветения при норме расхода 250-600 мл / 10-30 л воды.

ДРЕВЕСНЫЙ КУСТАРНИК:

Опрыскивание проводить, когда сорняки достигают в высоте 30 см, и до момента цветения при норме расхода 75 - 700 мл / Донум; при обработке следует обратить внимание на рост растений, плотность и погодные условия.

ВНИМАНИЕ:

- Использовать только на вышеупомянутых культурах.
- Не использовать гальванизированные опрыскиватели.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Опрыскивание следует проводить с помощью пластиковых или стекловолоконистых распылителей; после применения следует очистить использованный опрыскиватель.
- Норма расхода распыляемого раствора 20-60 л / Донум. Заполнить половину распылителя водой, затем добавить **ГРОУНД-АП** и хорошо перемешать. Затем долить оставшееся количество воды.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

- Опрыскивание с помощью обычного распылителя проводить только на травах и сорняках, подлежащих лечению.
- Чтобы повысить эффективность продукта, его следует распылять при вегетативном росте сорняков и до стадии цветения.
- Необходимо орошать обрабатываемую поверхность перед распылением для увеличения эффективности продукта и избегать орошения или культивирования области опрыскивания в течение одной недели после нанесения.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Перед применением препарата необходимо проводить калибровку распылителя.
- Рекомендуется полное покрытие во время распыления; эффективность препарата увеличивается при теплой температуре и нормальной влажности.
- Следует повторить опрыскивание, если осадки выпадут в течение 6 часов после проведения обработки.
- Если обрабатываемая площадь была обработана до распыления, то придется подождать, пока сорняки достигнут 20-30 см.
- Сорняки, которые растут в водных каналах, следует обрабатывать, если каналы не содержат воды.
- Чтобы контролировать однолетние сорняки, предпочтительнее начинать распыление, когда они имеют подходящий вегетативный рост и повторное опрыскивание проводить через 30-45 дней, когда сорняки имеют глубокий корневой рост.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:

Нельзя пасти или кормить животных в обработанной зоне в течение 21 дня.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

4 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Не рекомендуется смешивать с другими пестицидами.

*** ДРУГАЯ ФОРМУЛА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:**

GROUND-UP 41% SL W/W, GLYTEX- 48% SL, GLAND UP-48% SL, STIMOZADE-36% SL, FORASATE- 48% SL, WOUND-OUT 48% SL.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.