

HERBON - 80% WP

ХЕРБОН – 80%

ГЕРБИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Класс:

Мочевина

Системный селективный гербицид, предназначен для контроля однолетних трав и широколистных сорняков; эффективен при прорастании семян сорняков.

СОСТАВ: каждый кг содержит:

ДИУРОН

**80% вес / вес
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ХЕРБОН-80%: системный селективный гербицид, всасывается через листья.

ХЕРБОН-80%: высокоэффективен для контроля однолетних трав и широколистных сорняков.

ХЕРБОН-80%: имеет низкую токсичность для млекопитающих.

ХЕРБОН-80%: используется до и после посадки в соответствии с рекомендуемыми нормами.

КУЛЬТУРА	ВИД СОРНЯКА	МЕТОД И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	НОРМА РАСХОДА
Яблони и груши (минимальный возраст 1 год)	Амарант, ячменная трава, ежовник, календула, череда волосистая, диктилоктениум египетский, лебеда, гвинейская трава, горчица, плевел, осот, чертополох, летняя трава, дикая редька, дикая репа.	Одно применение: одно применение в зимний период. Дробное применение: Первую обработку проводить после сбора урожая, вторую – проводить весной. -Не используйте под карликовыми грушами.	Одиночное применение 450 г / Донум Дробное применение: 230 г / Донум

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**

Спаржа	Однолетник широколистный, сорняки и некоторые однолетние травы.	- Не использовать на рассаде спаржи. - Применять до появления колосьев.	170-230 г / Донум
Бананы, Авокадо, Манго.		Избегать контакта с банановыми растениями.	230-450 г / Донум На банановых посевах: применять 20-50 л воды / Донум.
Папайя		(не для использования на деревьях моложе 9 месяцев)	225-450 г / Донум.
Цитрусовые (минимальный возраст 1 год)		Применять до появления сорняков осенью и весной. Не добавлять поверхностно-активное вещество / смачивающий агент, так как спрей может контактировать с листвой цитрусовых.	230-450 г / Донум (Применить 400 л воды / донум).
Кофе, пекан-орех.		Первоначально высокая доза при обработке, затем следует проводить обработку при небольшой дозе препарата.	450 г после 230 г / Донум
Виноград		Наносите как спрей «под виноградной лозой» до появления сезонных сорняков.	225-450 г / Донум
Семена травы		Более низкие дозы использовать во втором году.	337-370 г / Донум
Ананасы		Применяется после посадки и появления всходов.	450 г / Донум (применять 400 л воды / Донум)
Люпины			

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

		Предпосевная до появления всходов.	124 г / Донум
Хлопок		Одно применение до прорастания всходов. Одно применение после прорастания всходов за сезон.	112-230 г / Донум (применять 30-45 л воды / Донум).
Люцерна		Применять после выпаса скота.	112-230 г / Донум
Кукуруза		Послевсходовая обработка: -применять 100 г / Донум с ПАВ. Или 75 г / Донум в сочетании с азотными удобрениями. - Не наносить поверх кукурузы.	75-100 г / Донума
Сахарный тростник	Большинство трав, лоза и другие широколиственные сорняки, после прорастания из семян или на ранней стадии рассады.	Высокая дозировка при предварительном появлении тростника. Дождь или орошение в течение 10 дней с момента применения.	225-450 г / Донум
Пшеница, Ячмень, Овес, Тритикале.	Песчанка, горчица полевая, лебяжник, донник, горчица, мак, шафрановый чертополох, овечья травка, репа, сурепица.	Распылять не позднее, чем на ранней стадии кущения.	56 г / Донум (применять 40-70 л воды / Донум)
Каучуковое дерево	Однолетние широколиственные сорняки и некоторые однолетние травы.	Смешивается с контактным гербицидом.	200-300 г / Донум
Масличная пальма и кокосовая		Обрабатывать в питомниках и на молодых плантациях контактным гербицидом.	200-300 г / Донум

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

пальма	(Ореховая трава, Вьюнок, Джонсонова трава)		
Железные дороги, парки и промышленны е зоны предприятий		Не проводить обработку во время сухого сезона. После выпадения дождя химические вещества попадают в корневую зону, где происходит их поглощение корнями.	Железнодорожная цистерна или штанговый опрыскиватель - (506-2025 г / Донум) Годовое количество осадков от 0 до 500 мм (применять 40-80 л воды / Донум). Большой объем или мощность распыления. - (500-2000 г / Донум) Годовое количество осадков 0-500 мм и более (эквивалентно 200 л воды / Донум)
Небольшие участки		Сельскохозяйственный ранцевый опрыскиватель	100 г на 15 л воды / 20м ²

Донум = 1000 м²

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Использовать только на указанных культурах.
- Перед использованием необходимо провести калибровку распылительного оборудования.
- Опрыскивание листвы у появившихся сорняков проводят с добавлением поверхностно-активного вещества / смачивающего агента (доза указана на этикетке).
- Опрыскивание проводить на влажной почве до появления сорняков, если не используют другие препараты.
- Наилучшие результаты после опрыскивания достигаются при активном росте сорняков.
- Не опрыскивать растения, если в течение 6 часов ожидается сильный дождь.
- Не обрабатывать растения, находящиеся в состоянии стресса.
- Ананасы и сахарный тростник: обработанные участки можно использовать для посадки через 1 год после последнего применения.
- Хлопок и люцерна: не пересаживать на обработанные участки земли в течение 1 года после применения, так как можно травмировать растения.
- Не хранить смесь для опрыскивания более 21 часа.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить животных из обработанном участке в течение 70 дней с момента последнего применения.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: Не использовать поле в течение 24 часов с момента последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, но желательно перед использованием сделать пробное смешивание с одним из следующих пестицидов: Ally, Paraquat (200 г или 250 г), Diquat, Trifluralin, 2,4-d Amine и сложный эфир и МСРА гербициды).

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**