

LIDOPHRINE ЛИДОФРИН

Раствор для инъекций
Местный анестетик

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
обезболивающее средство

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Лидокаин гидрохлорид
Эпинефрин Кислотный тартрат

20 мг
0,01 мг

СВОЙСТВА:

Лидофрин - быстродействующий местный анестетик, который продуцирует примерно вдвое больше площади анестезии, вырабатываемой равными концентрациями прокаина. Добавляют эпинефрин, чтобы продлить продолжительность анестезии и уменьшить системную абсорбцию.

ПОКАЗАНИЯ:

Местный анестетик, используемый при инфильтрации, проводниковой и эпидуральной анестезии у собак, кошек, крупного рогатого скота, лошадей и овец.

ДОЗИРОВКА:

Лошади:	Блок волярного нерва	5 - 10 мл
	Низко эпидурально (возбужденному животному)	5 - 12 мл
	Инфильтрационно	2 - 50 мл
КРС:	Низко эпидурально (возбужденному животному)	5 мл
	N. Cornualis блок (удаление рогов)	20 мл
	Паравертебрально (на каждом участке)	10 - 15 мл
	(для последнего грудного)	20 мл
	Инфильтрационно	5 - 100 мл
Теленок:	Эпидурально	3 - 10 мл
Овцы:	Эпидурально	3 - 7 мл
	Инфильтрационно	2 - 50 мл
Собаки:	Эпидурально	2 - 10 мл
	Блок плечевого сплетения (собака среднего размера)	10 мл
	Инфильтрационно	2 - 10 мл
Кошки:	Эпидурально	0.5 - 2 мл
	Инфильтрационно	0.5 - 4 мл

ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда использовать минимально возможную концентрацию и дозу. Вводить медленно.
Не вводить внутривенно.

Инфильтрационная анестезия может быть получена путем внутримышечной или подкожной инъекции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечание перед использованием:

Инъекции следует вводить сразу после забора из бутылки, так как продукт может реагировать с металлическими компонентами шприца.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: • **Мясо:** за 5 дней до убоя
• **Молоко:** 4 дня.

ХРАНЕНИЕ: хранить в сухом, темном месте ниже 30 ° C.

УПАКОВКА: 100, 50 мл.