

LIDOVAR – 2%

ЛИДОВАП - 2%

Раствор для инъекций
Местный анестетик

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
обезболивающее средство

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Лидокаин гидрохлорид

20 мг

СВОЙСТВА:

Очень эффективный местный анестетик амидного типа с низкой токсичностью и длительным действием.

ПОКАЗАНИЯ: используют для производства эпидуральной анестезии, проводниковой анестезии (блокирование) и инфильтрационной анестезии.

ДОЗИРОВКА:

- Для крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, кошек, собак, свиней.
- Дозы зависят от размера животного и района, подлежащего обезболиванию.
- Инъекцию вводить медленно.
- **Эпидуральная анестезия:**
 - Крупный рогатый скот, лошади: 5-15 мл.
 - Собаки, кошки: 1 мл / 5 кг массы тела.
 - Телята, овцы, козы: 3-10 мл.
- **Нервный блок:**
 - Крупный рогатый скот, лошади: 5-20 мл.
- **Инфильтрационная анестезия:**
 - Локально подкожно или внутримышечно инъекции.
 - Разбавить до 0,5% концентрации (1 мл 2% раствора с 3 мл стерильной воды = 4 мл 0,5% раствора).
 - Крупный рогатый скот: 5-100 мл.
 - Лошадь: 2-50 мл.
 - Свиньи: 60-80 мл (для лапаротомии).
 - Собаки: 2-10 мл (ампутация хвоста: 0,5 - 5 мл).
 - Кошки: 0,5 - 4 мл (местно при небольшой операции).

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса и молока: 5 дней.

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Не вводить внутривенно.
- Не давать животным с известной гиперчувствительностью к препарату.
- Эпидуральная анестезия не применяется к собакам, которые сильно страдают из-за опасности шока.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ :

- Лидокаин обычно хорошо переносится, но неблагоприятная реакция может возникать в случаях гиперчувствительности, при неправильной техники и чрезмерной дозировки.
- В случае затрудненного дыхания немедленно применять искусственное дыхание или дать кислород.
- Могут возникать жар, судороги и переходная сонливость при введении больших доз препарата.

ХРАНЕНИЕ: хранить в сухом, темном месте ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: 100, 50 мл.