

# ليفوزان

سائل معلق للتجريع

طارق الديدان للضأن والماعز والابقار

التركيب: كل مل يحتوي على:

ليفاميزول هيدروكلورايد	30 ملغم
اوكسي كلوزانيد	60 ملغم

## الخواص:

- تركيبة مشتركة من مادتين ذات تأثير واسع الطيف ضد الديدان الاسطوانية (المستديرة / النيماتود) التي تصيب الجهازين الهضمي والتنفسي وكذلك الديدان الكبدية.
- الاوكسي كلوزانيد: يزيل عملياً جميع الديدان الكبدية المتواجدة في القنوات الصفراوية.
- الليفاميزول:
  - هو خليط من نظيرين ضوئيين متشابهين لمادة التتراميزول.
  - يزيل المراحل البرقية البالغة وغير البالغة لمجموعة كبيرة من الديدان الاسطوانية (المستديرة / النيماتود) كما ان له مفعولاً شديداً ضد انواع الديدان التالية:
    - ديدان المنفحة: هيمنوكس، اوسترتيجيا، ترايكوسترونجايلس.
    - الديدان المعوية: ترايكوسترونجايلس، كوبريا، نيماتودايرس، اوسيفاجوستوم، شابيرتيا، بونوستوم.
    - الديدان الرئوية: دكتيوكولاس فيفارس ويرقاتها.

## الإستطبابات:

- معالجة و مكافحة الانواع المختلفة من الديدان التي تصيب الجهازين الهضمي والتنفسي وكذلك الديدان الكبدية.
- ديدان الجهاز الهضمي:
  - نيماتودايرس، هيمنوكس، كوبريا، اوسترتيجيا، شابيرتيا، ترايكوسترونجايلس، بونوستوم، اوسيفاجوستوم، سترونجيلويدس.
  - الديدان الرئوية: دكتيوكولاس.
  - الديدان الشريطية: مونيزيا.
  - الديدان الكبدية: فاشيولا.

## الجرعات:

- ترج العبوة جيداً قبل الاستعمال.
- الضأن والماعز والابقار:
  - 2.5 مل / 10 كغم وزن جسم تعطى بواسطة التجريع بالفم.
  - (15 ملغم اوكسي كلوزانيد / كغم وزن جسم).
  - (7.5 ملغم ليفاميزول هيدروكلورايد / كغم وزن جسم).

## فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: 18 يوماً.
- لاستهلاك الحليب: 3 ايام.

## تنبيهات:

- يمكن اعطاؤه للحيوانات الصغيرة والحوامل والحلابة.
- يمكن معالجة الحيوانات بالمبيدات الحشرية الفسفورية العضوية بعد اسبوعين من التجريع.

## التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال.
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.