

# ليدوفرين

محلول للتخدير الموضعي بالحقن

التركيب: كل مل يحتوي على:

ليدوفرين هيدروكلورايد	20 ملغم
ايبينفرين أسيد تارتريت	0.01 ملغم

## الخصائص:

- مخدر موضعي سريع التأثير والذي يعطي حوالي ضعف الفعالية التي يمكن ان تعطيتها التراكيز نفسها من مادة البروكين. كما تقوم مادة اليبينفرين باطالة حالة التخدير وتخفيض الامتصاص الجهازية.

## الاستطابات:

- مخدر موضعي للتخدير الارتشاحي والحاصر للعصب وفوق جافية العصب، في الكلاب والقطط و الابقار والخيول والاعنাম.
- الجرعات:

الجرعات:	التخدير الحاصر للعصب	الخيول
5-10 مل	التخدير فوق جافية العصب	
5-12 مل	التخدير فوق جافية العصب	
2-50 مل	الارتشاحي	
5 مل	التخدير فوق جافية العصب	الابقار
20 مل	التخدير الحاصر للعصب (ازالة القرون)	
10-15 مل	التخدير في جانب الفقرات (لكل جانب)	
20 مل	التخدير للفقرة الصدرية الاخيرة	
5-100 مل	الارتشاحي	
3-10 مل	التخدير فوق جافية العصب	العجول
3-7 مل	التخدير فوق جافية العصب	الاعنাম
2-50 مل	الارتشاحي	
2-10 مل	التخدير فوق جافية العصب	الكلاب
10 مل	لتخدير الضفيرة العضدية (كلب متوسط الحجم)	
2-10 مل	الارتشاحي	
0.5-2 مل	التخدير فوق جافية العصب	القطط
0.5-4 مل	الارتشاحي	

## ملاحظة:

- يجب استخدام اقل تركيز وجرعة ممكنة والحقن ببطء.
- لا يستخدم عن طريق الوريد.
- يمكن الوصول للتخدير الارتشاحي عن طريق الحقن تحت الجلد او بالعضل.

#### تنبيه:

- يجب اجراء الحقن الفوري بمجرد سحب المستحضر من عبوته، حيث ان المستحضر قد يتفاعل مع المكونات المعدنية للحقن.

#### فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: 5 ايام قبل الذبح.
- لاستهلاك الحليب: 4 ايام.

#### التخزين:

- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة اقل من 30° م.

العبوات: (50، 100) مل.