

كربونات الماغنيسيوم (دستوري)

بودرة قابلة للإنتشار في الماء
(مضاد للحموضة والنفاخ، ملينة ومزيلة للسمية)

الخواص:

- حماية الاغشية المخاطية للمعاء، وامتزاز المواد المهيجة والسامة، ومنع امتصاصها.
- تعمل على معادلة حامض المعدة، وتحول الحامض اللبني في الكرش والنتاج عن افراط الحيوان في تناول المواد النشوية الى مواد قلووية غير ضارة.
- ملينة ومضادة للنفاخ.
- سرعة افرازها مع البول، في حالة امتصاص أي جزء منها.

الإستطبابات:

- حالات عسر الهضم والتلبك المعوي.
- الاصابة بالتسمم الناتج عن رعي نباتات سامة او متعفنه او متخمرة.
- الامساك والنفاخ والتخمة الناتجة عن زيادة تناول العليقة الجافة والغنية بالنشويات.
- حالات الحموضة الزائدة في المعدة، وتلك الناتجة عن تجمع الحامض اللبني في الكرش.
- تعطى كعلاج مساعد في حالات قرحة المعدة.
- حالات التسمم بالاحماض او المواد الحمضية الاخرى.
- يمكن اضافتها الى العليقة او المركّزات العلفية للوقاية من الاصابة بنقص الماغنيسيوم (الكرزاز العشبي).

الجرعات:

- تعطى كتجريع او بواسطة انبوية اللي المعدي.
- يمزج العلاج مع الماء جيداً، ويرج المزيج جيداً قبل الاستعمال.
- الابقار والجمال والخيول: 100-150 غم للحيوان الواحد مع 1-2 لتر ماء.
- العجول والضأن والماعز: 40 غم للحيوان الواحد مع كمية 0.5-1 لتر ماء.
- الكلاب والقطط: 5-10 غم للحيوان الواحد مع كمية كافية من ماء الشرب.
- (في حالة حموضة المعدة، يفضل اعطاء العلاج بين وجبات الطعام، وفي الليل).
- الارانب: 1 غم للحيوان الواحد مع الشرب.
- للوقاية من الكرز العشبي: يعطى مع العليقة وطيلة فترة احتمال حدوث الاصابة.
 - الضأن والماعز والعجول: 15 غم يومياً.
 - الابقار: 60 غم يومياً.
- في حالات الحموضة والنفاخ، يمكن اضافة بيكربونات الصوديوم (1.5 غم/10 كغم وزن جسم) الى الجرعة المقررة من كربونات الماغنيسيوم.

فاركو

علاجات النفاخ والتلبك
المعوي والمليينات

فترة الامان:

- لاستهلاك الحليب: 12 ساعة.

تنبيهات:

- يمكن اعادة المعالجة عند الضرورة.
- قد تحدث حالات اسهال بسبب الجرعات الزائدة.
- تجنب استعمال العلاجات التي تسبب القيء، في حالات التسمم بالاحماض او المواد الحمضية.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.