

NEOSYCLIN НЕОЦИКЛИН

Водорастворимый порошок

VARCO

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
ВИТАМИНЫ

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Окситетрациклин HCl	55.55	мг	Витамин К3	0.5	мг
Колистина Сульфат	55.55	мг	Витамин В 12	0.9	мкг
Витамин А	1,120	М.Е.	Витамин В 2	0.002	мг
Витамин D3	250	М.Е.	Никотиновая кислота	8.9	мг
Витамин Е	0.345	М.Е.	Са-D-пантотенат	3.4	мг
Соли микроэлементов (железо, марганец, цинк, медь, кобальт).			1.1	мг	

СВОЙСТВА:

- Неоциклин представляет собой высокоэффективную комбинацию антибиотиков широкого спектра действия и витаминов.
- Окситетрациклин - антибиотик широкого спектра действия, обладающий бактериостатическим эффектом против большого числа грам-положительных и грам-отрицательных микроорганизмов, (стрептококк, стафилококк, пастереллы, бруцеллы, коринебактерии, эризипелотрикс, колиформные бактерии, сальмонеллы), а также против риккетсий, микоплазм, хламидий и некоторых простейших.
- Неомицина сульфат это антибиотик из группы аминогликозидов, обладающий бактерицидным действием. Эффективен против различных бактерий, вызывающих энтериты и маститы: Streptococci, Staphylococci, Echerichia coli, Salmonella, Campylobacter, Actinobacillus, Listeria, Proteus.
- Противомикробная активность окситетрациклина происходит как в сыворотке крови, так и в желудочно-кишечном тракте, тогда как активность неомицина концентрируется в желудочно-кишечном тракте.
- Витамины и микроэлементы повышают жизнеспособность и поддерживают устойчивость организма к инфекциям.

ПОКАЗАНИЯ:

• Домашняя птица

Инфекционный энтерит, птичья холера, болезнь Пуллорума, птичий тиф, моноцитоз, омефалит, гексамитиаз.

• **Млекопитающие**

Инфекционный энтерит, такой как колибактериоз или сальмонеллез, энтеротоксичность, вторичные инфекции вирусных заболеваний, бактериальные респираторные заболевания.

ДОЗИРОВКА: (Продолжительность в течение 3-5 дней).

• **Птица:**

- **Лечебная доза:** 180 г на 100 литров питьевой воды.
- **Профилактическая доза:** половина дозы за тот же период.

• **Млекопитающие:**

- **Ягнята, козлята:** 2 г на ягненка ежедневно с питьевой водой или молоком.
- **Телята:** 14 г на теленка ежедневно с питьевой водой или молоком в течение первых 7 дней жизни.
- **Коровы:** 14 г на мясного скота ежедневно с питьевой водой в течение первого месяца периода откорма. В последний месяц периода откорма повторяют тот же режим.

Время выведения препарата: Для потребления мяса и яиц: 7 дней.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Во время лечения минеральные соли не следует добавлять в лечебную воду.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 25 °С.

УПАКОВКА: 180 г.