

NICLOSAMIDE-70% НИКЛОСАМИД-70%

МОЛЛЮСКОЦИД
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Класс:
Производные
Хлорнитрофенола

Моллюскицид, эффективный против улиток, которые выступают в качестве промежуточных хозяев; кроме того, препарат используется в ветеринарии при лечении от взрослых ленточных червей.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

НИКЛОСАМИД

**70% вес / вес
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

НИКЛОСАМИД-70%: моллюскицид, обладает дыхательным и желудочным действием.

НИКЛОСАМИД-70%: контролирует развитие золотой ампулярии на рисе и убивает пресноводных улиток, которые являются промежуточными хозяевами ленточных червей. Препарат также используется в ветеринарии.

НИКЛОСАМИД-70%: нефитотоксичен для курицы.

НИКЛОСАМИД-70%: слегка токсичен для млекопитающих и высокотоксичен для рыб, оказывает несущественный летальный эффект на пчел.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

- **НИКЛОСАМИД-70%:** Используется для контроля водной улитки и золотой ампулярии на рисе, кукурузе и цитрусовых.

- **НИКЛОСАМИД-70%:** количество, которое необходимо применять для достижения высокой эффективности, в основном зависит от уровня воды в рисе во время обработки.

- Если глубина воды 3 см, то рекомендуемая норма расхода

НИКЛОСАМИД-70% составляет 360 г / Га.

- Если уровень воды более 3 см, то норма расхода **НИКЛОСАМИД-70%** 540 г / Га.

Гектар = 10000 м².

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Хорошие результаты достигаются, если **НИКЛОСАМИД-70%** применяется после пересадки риса, когда поле орошается и золотая яблонная улитка становится активной.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Степень ущерба зависит от плотности популяции и возраста улитки.
- Активность улитки определяется уровнем воды на рисовых полях.
- Рисовые растения подвергаются особому риску со стороны улиток в первые 15 дней после посадки.
- Золотая яблонная улитка может выжить в засушливые периоды до 3 месяцев, закопавшись в почве и лежа в состоянии покоя. Такое поведение означает, что летние насаждения подвергаются большему риску, после наводнения улитки снова становятся активными в течение 5-10 минут.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместимо с большинством пестицидов, кроме кислот.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.