

# **NOGREEN-28%**

# **НОГРИН-28%**

## **ГЕРБИЦИД**

### **КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ**

**Класс:**  
Гидроксибензонитрилы

**Селективный контактный гербицид избирательного действия, предназначен для борьбы с однолетними широколистными сорняками после появления всходов пшеницы, ячменя, кукурузы, лука, чеснока, люцерны, на полях свободных от сельскохозяйственных культур и в промышленных зонах.**

**СОСТАВ:** каждый литр содержит:

**БРОМОКСИНИЛ ОКТАНОАТ**

**28% вес / объем  
(активного вещества)**

#### **СВОЙСТВА:**

**НОГРИН-28%:** селективный контактный гербицид с незначительной системной активностью; поглощается листовой, обладает ограниченной транслокацией.

**НОГРИН-28%:** контролирует развитие сорняков, подавляет фотосинтез.

**НОГРИН-28%:** селективный контактный гербицид, используемый для борьбы с однолетними широколистными сорняками после появления всходов пшеницы, ячменя, кукурузы и лука.

**НОГРИН-28%:** умеренно токсичен для млекопитающих, токсичен для рыб и не токсичен для пчел.

#### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:**

<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>СОРНЯКИ</b>	<b>ДОЗИРОВКИ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<b>БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД</b>
<b>Пшеница, ячмень</b>	Однолетние широколистственные сорняки, такие как: хризантема, подмаренник, колючий щавель.	1,5 - 2 л / Га (200 - 400 л воды / Га) После появления всходов до начала стадии кущения.	42 дня
<b>Кукуруза</b>		1,5 - 2 л / Га (200 - 400 л воды / Га). Наносить на стадии 2-8 листов.	42 дня
<b>Чеснок</b>		2,3 - 3 л / Га (200 - 400 л воды / Га). Наносить после появления всходов, но до высоты 30 см.	3.5 месяца
<b>Лук</b>		1,5-2 л / Га (200-400 л воды / Га). Наносить на стадии 2 - 5	1 месяц

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

		листов.	
<b>Люцерна</b>		1,5-2 л / Га (200 - 400 л воды / Га). Применять от сорняков, когда достигают высоты 5 см.	1 месяц
<b>Необрабатывае мые земли и промышленн ые площадки</b>		1,5 - 2 л / Га (200 - 400 л воды / Га). Наносить при появлении сорняков и их активном росте.	---

Донум = 1000 м<sup>2</sup> Гектар = 10000 м<sup>2</sup>

#### **ВНИМАНИЕ:**

Использовать только на выше упомянутых культурах, соблюдая рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Важно провести калибровку опрыскивателя перед применением.
- Опрыскивать следует до появления 6-го листа.
- Необходимо обеспечить полное покрытие всех сорняков гербицидом.

#### **ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПАС:**

Не пасти и не кормить животных не менее 60 дней с момента последнего применения.

#### **ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:**

48 часов после последнего применения.

#### **СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Совместим с большинством других гербицидов.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.