

NORALGIN НОРАЛГИН

Раствор для инъекций

Анальгетик, спазмолитик, жаропонижающий,
противовоспалительный

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
АНАЛЬГЕТИКИ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Метамизол натрий

500 мг

СВОЙСТВА:

- Относится к группе пиразолона, которая проявляет анальгетическое, жаропонижающее, противоревматическое и спазмолитическое действие.
- Снимает спазмы гладких мышц.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей, собак, кошек, свиней.
- Различные боли в животе, метеоризм и тимпанит.
- Спазмы шейки матки во время родов.
- Острая дилатация желудка, сопровождающаяся сильными припадками колик.
- Подготовка хирургической и акушерской операции.
- Боли, вызванные кишечным запором у лошадей.
- Обструкция пищевода (дроссель) инородными телами для облегчения судорог.
- Устранение раздражения и расстройства лошадей перед подготовкой к промыванию желудка.
- Билиарная и почечная колика (мочекаменная болезнь).
- Лихорадочные случаи острого мастита, гриппа.
- Острый и хронический артрит, ревматизм, неврит, невралгия, тендовагинит.
- Бронхиальные спазмы с одышкой.

ДОЗИРОВКА: (путем внутримышечной и подкожной инъекции)

- Непарнокопытные: 20-60 мл (4 мл / 50 кг).
- Жеребцы: 5-15 мл.
- Крупный рогатый скот: 15-40 мл.
- Овцы, козы: 2-10 мл.
- Свиньи: 10-30 мл.
- Собаки: 1-5 мл.
- Кошки: 0,5-2 мл.
- Инъекции могут повторяться.
- Очень медленные внутривенные инъекции можно применять только в очень тяжелых условиях, но дозу следует уменьшить.

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Гонка - лошадь должна отдохнуть в течение 5 дней до гонки.
- Не следует назначать Фенилбутазон и барбитураты.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА • Для потребления мяса: 12 дней.
• Для потребления молока: 4 дня.

ХРАНЕНИЯ:

- Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре ниже 30 ° C.
- Не замораживать.
- Защищать от света.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.