

نورالجين

محلول للحقن

مسكن، مضاد للتقلصات، خافض للحرارة، مضاد للالتهاب

التركيب: كل مل يحتوي على:

500 ملغم

ميثاميزول صوديوم

الخواص:

- ينتمي الى مجموعة (بيرازولون) والمتميزه بفعاليتها لتسكين الالم وخفض الحرارة ، وكمضاد للروماتزم وللتشنجات.
- تخفيض تشنجات العضلات الملساء.

الاستطابات:

- للضأن والماعز والابقار والخيول والكلاب والقطط والخنزير .
- آلام المغص التشنجي والنفخي.
- تشنجات وتقلصات عنق الرحم أثناء الولادة.
- تقلصات المعدة والمصحوية بالمغص الشديد.
- تجهيز الحيوان للجراحة او الولادة.
- الالم الناتج عن حالة الإمساك في الخيول.
- تخفيف الالم نتيجة انسداد المريء (الغصة) بجسم غريب او بالطعام.
- تهدئة الخيل وتخفيف التوتر والالم لتجهيزها لاجراء غسيل المعدة.
- حالات المغص المراري والكولي والمسالك البولية الاخرى (وجود الحصى).
- حالات الحمى الناتجة عن التهاب الضرع الحاد والامراض التنفسية.
- التهاب المفاصل الحاد والمزمن وروماتزم العضلات والمفاصل، والتهاب الاعصاب والغمد.
- تشنجات القصبة الهوائية وحالات ضيق التنفس.

الجرعات:

- يعطى حقناً بالعضل او تحت الجلد.
- الخيول: 20 - 60 مل (4 مل / 50 كغم وزن جسم).
- الامهر: 5 - 15 مل.
- الابقار: 15 - 40 مل.
- الضأن والماعز: 2 - 10 مل.
- الخنازير: 10 - 30 مل.
- الكلاب: 1 - 5 مل.
- القطط: 0.5 - 2 مل.
- يمكن تكرار الجرعة عند الضرورة.
- في الحالات الشديدة جداً، يمكن الحقن بالوريد وبيطء شديد مع تخفيض الجرعة.

تنبيهات:

- يجب استراحة خيول السباق لمدة خمسة أيام قبل دخول السباق.
- يجب عدم اعطاء مستحضرات (فينايل بيوتازون، والباربيتورات) تجنباً لحدوث التداخلات الدوائية.

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: 12 يوماً.
- لاستهلاك الحليب: 4 ايام.

التخزين:

- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة اقل من 30 °م.
- لا يحفظ في المجمد (الفریزر).
- يحفظ بعيداً عن الضوء.

العبوات: (50، 100) مل.