

OXYDONE-10% **ОКСИДОН-10%**

Раствор для инъекций
Для крупного рогатого скота

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Окситетрациклин-НСI

100 мг

СВОЙСТВА:

- Антибиотик широкого спектра действия против чувствительных грам-положительных бактерий (Staph, Strept, Coryne, Clostridia, Erysipelothrix) и грам-отрицательных бактерий (E.coli, Pasteurella, Actinobacillus, Moraxella), микоплазм, простейших, гемофильной инфекции, спирохетов, хламидий, лептоспир, рикетций, листерий и некоторых крупных вирусов.
- Распространяется быстро и широко во всех тканях организма.

ПОКАЗАНИЯ:

- Окситетрациклин активен против широкого спектра грам-положительных и грам-отрицательных патогенных бактерий, некоторых микоплазм, риккетсий, простейших и хламидий
- Предназначен для лечения широкого спектра общих респираторных, желудочно-кишечных, урогенитальных и локальных инфекций у лошадей, крупного рогатого скота, овец.

ДОЗИРОВКА: (внутримышечно или путем медленной внутривенной инъекции).

- **Крупный рогатый скот, лошади, овцы:** 1 мл на 10 кг массы тела один раз в день в течение 5 дней.
- **Максимально рекомендуемая доза:**
 - Крупный рогатый скот 20 мл
 - Лошади 20 мл
 - Овцы 10 мл
- Разделить дозировку на отдельные места инъекции, чтобы свести к минимуму местное раздражение тканей.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- **Крупный рогатый скот:**

Для потребления мяса: через 21 день последнего лечения.

Для потребления молока: через 96 часов после последнего лечения.

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ

- **Овцы:** для потребления мяса: 14 дней после последнего лечения.

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Не рекомендуется использовать для собак и кошек
- На месте инъекции в течение нескольких дней может возникать отек.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.