

OXYDONE-5%

ОКСИДОН-5%

Раствор для инъекций

Для крупного рогатого скота

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Окситетрациклин-НСІ

50 мг

VAPCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ

СВОЙСТВА:

- Антибиотик широкого спектра действия против чувствительных грам-положительных бактерий (Staph, Strept, Coryne, Clostridia, Erysipelothrix) и грам-отрицательных бактерий (E.coli, Pasteurella, Actinobacillus, Moraxella), микоплазмов, простейших, гемофильной инфекции, спирохетов, хламидий, лептоспир, рикетций, листерий и некоторых крупных вирусов.
- Распространяется быстро и широко во всех тканях организма.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для овец, коз, крупного рогатого скота, буйволов, верблюдов, свиней, собак, кошек, кроликов, домашней птицы.
- Лечение различных случаев:
 - лихорадка, деревянный язык (Actinobacillus), конъюктивит у коров и овец, свиная дизентерия (спирохэтоз), атрофический ринит у свиней, дизагалактия, гниение ног, дифтерия теленка.
 - анаплазмоз (тейлериоз) и сердечная вода у крупного рогатого скота (Эрлихия «Рикетсия»), красная вода у телят (Лептоспира).
 - Энзоотический аборт (хламидиоз) у овец и коз.
 - Клостридиальные инфекции: энтеротоксимия (дизентерия баранины, черная нога, отек злокачественного новообразования).
 - Понос, энтерит, диарея.
 - Сепсис, пиемия, перитонит, гнойное воспаление суставов, раны и кожные инфекции, абсцессы.
 - Поддерживающая терапия при мастите.
 - Инфекции дыхательных путей: бронхит, пневмония, ринит и т. д.
 - Инфекции мочевыводящих путей: нефрит, пиелонефрит, цистит.
 - Инфекции половых путей: метриты, послеродовая лихорадка и т. д.

- Контроль послеоперационных и послеродовых инфекций.
- Бактериальные осложнения вирусных заболеваний.
- Птица: колибактериоз, синусит, кориза, хронические респираторные инфекции, синий гребень, микоплазмоз.
- Кролики: диарея, пневмония, энтерит и т. д.

ДОЗИРОВКА: (глубоко внутримышечно или подкожно, инъекция).

Продолжительность лечения: 3-5 дней.

- **Крупный рогатый скот, буйволы, верблюды, овцы, козы, свиньи:** 0,3-0,8 мл на 10 кг массы тела ежедневно.
- **Собаки, кошки:** 0,5-1 мл на 5 кг массы тела ежедневно.
- **Кролики, домашняя птица:** 0,5-2 мл на животное ежедневно.
- Разделить дозировку на отдельные инъекции, чтобы свести к минимуму местное раздражение тканей.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: • Для потребления мяса: 14 дней.

- Для потребления молока: 5 дней.

Пожалуйста, внимательно прочтайте примечания перед использованием:

- Может возникать временный местный отек после инъекции в течение нескольких дней.
- Не назначается с пенициллинами, так как может возникать вмешательство.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.