

OXYDONE-FORTE 20% LA

ОКСИДОН-ФОРТЕ 20%

Раствор для инъекций
Для крупного рогатого скота

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Окситетрациклин-HCl

200 мг

СВОЙСТВА:

- Антибиотик широкого спектра действия против чувствительных грам-положительных бактерий (Staph, Strept, Coryne, Clostridia, Erysipelothrix) и грам-отрицательных бактерий (E.coli, Pasteurella, Actinobacillus, Moraxella), микоплазм, простейших, гемофильной инфекции, спирохетов, хламидий, лептоспир, рикетций, листерий и некоторых крупных вирусов.
- Обеспечивает терапевтическую эффективность до (4) дней после однократного лечения.
- Хорошо переносится и быстро проникает во все ткани организма, достигая своего пикового уровня за короткое время и остается активным в течение длительного периода.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для овец, коз, крупного рогатого скота, буйволов, верблюдов, свиней, собак, кошек, кроликов, домашней птицы.
- Лечение различных случаев:
 - лихорадка, деревянный язык (Actinobacillus), конъюнктивит у коров и овец, свиная дизентерия (спирохетоз), атрофический ринит у свиней, дизагалактия, гниение ног, дифтерия телят.
 - анаплазмоз (тейлериоз) и сердечная вода у крупного рогатого скота (Эрлихия «Рикетсия»), красная вода у телят (Лептоспира).
 - Энзоотический аборт (хламидиоз) у овец и коз.
 - Клостридиальные инфекции: энтеротоксимия (дизентерия ягнят, черная нога, злокачественный отек).
 - Понос, энтерит, диарея.
 - Сепсис, пиемия, перитонит, гнойное воспаление суставов, раны и кожные инфекции, абсцессы.
 - Поддерживающая терапия при мастите.
 - Инфекции дыхательных путей: бронхит, пневмония, ринит и т. д.
 - Инфекции мочевыводящих путей: нефрит, пиелонефрит, цистит.

- Инфекции половых путей: метриты, послеродовая лихорадка и т. д.
- Контроль послеоперационных и послеродовых инфекций.
- Бактериальные осложнения вирусных заболеваний.

ДОЗИРОВКА: глубокой внутримышечной инъекцией.

- Крупный рогатый скот, буйволы, верблюды, овцы, козы, свиньи: 1 мл на 10 кг массы тела в одной разовой дозе.
- В тяжелых случаях повторите инъекционную дозу через 3-5 дней.
- Вводить не более чем (20 мл) крупного рогатого скота, буйволов, верблюдов и не более (5 мл) у овец, коз, свиней, которые должны быть даны на том же участке.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Для потребления мяса: 28 дней.
- Для потребления молока: 4 дня.

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Не рекомендуется применять для лошадей, собак, кошек.
- Разделить дозировку на отдельные места инъекции, чтобы минимизировать местное раздражение тканей
- Может вызвать боль в месте инъекции.
- На месте инъекции в течение нескольких дней может возникать отек.
- Иногда могут возникать аллергические реакции, в таких случаях прекращать использование и давать антигистаминные препараты (адреналин и др.), при необходимости, при симптоматическом лечении.
- Не давать совместно с пенициллином, препаратами кальция и железа.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.