

OXYDONE FORTE-30% LA

ОКСИДОН ФОРТЕ-30%

Раствор для инъекций

Для крупного рогатого скота

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Окситетрациклин-HCl

300 мг

СВОЙСТВА:

- Антибиотик широкого спектра действия против чувствительных грам-положительные и грам-отрицательные патогенные бактерии, некоторых микоплазм, риккетсий, простейших и хламидий, указанных при лечении широкого спектра общих системных, респираторных, желудочно-кишечных, урогенитальных и локальных инфекций, вызванных или связанных с организмами, чувствительными к окситетрациклину у крупного рогатого скота и свиней.

- Конкретные признаки включают:

Дифтерия телят, абсцесс стопы, мастит, метрит, пастереллез и пневмония, синдром "метрит-мастит-агалактия", гнойное воспаление суставов.

ДОЗИРОВКА: вводить путем глубокой внутримышечной инъекции (разовая доза)

- **Крупный рогатый скот:** 1 мл на 15 кг, каждые 3-4 дня

- **Овцы, козы:** 1 мл на 15 кг, каждые 3-4 дня

- **Свиньи:** 1 мл на 15 кг массы тела в течение 4-5 дней

При длительной активности (4-5 дней у крупного рогатого скота, 5-6 дней у свиней) 1 мл на 10 кг.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Молоко: крупный рогатый скот, овцы, козы: 10 дней.

- Мясо: крупный рогатый скот: 35 дней

Овцы, козы, свиньи: 28 дней.

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Может вызвать боль в месте инъекции.

- На месте инъекции в течение нескольких дней может возникать отек.

ВНИМАНИЕ:

- Не использовать для телят.
- В период развития зубов и костей, включая позднюю беременность, может привести к обесцвечиванию зубов.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.