# OXYTETRACYCLINE – 5% OКСИТЕТРАЦИКЛИН – 5%

## Для пчел Водорастворимый порошок

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

# VAPCО препараты пчеловодства

### Окситетрациклин HCl

50 мг

### показания:

Для контроля и лечения американской и европейской гнильцы (Sipsigonia) у пчел.

### ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

• Лечение:

### • Распыление:

- Хорошо перемешать (60) г продукта с (240) г сахарной пудры, тщательно измельчить. Затем быстро распылить на рамки (20) г для каждого улья (2 г на фрейм).
- При необхолимости повторите лечение с интервалом (3) дня.

### • Сахарный сироп:

- Сначала 6 гр препарата растворяют небольшим количеством теплой кипяченой воды, затем смешивают с сахарным сиропом (1-2 литр) в концентрации (1:1) и скармливают семьям из расчета на 1 рамку с пчелами в улье.
- Лечебные обработки проводят 3-5 раз с интервалом 3 дня до исчезновения клинических признаков заболевания.
- Профилактика: использовать половину дозы (3) раза с интервалом (3) дня.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Применять лекарство вечером, когда все кормушки находятся внутри улья.
- Не применять во время сбора меда, иначе мед следует использовать в промышленных целях, а не для потребления человеком.
- Лекарство давать после сбора меда и прекращать лечение за месяц до сбора урожая.
- Серьезно инфицированные рамы и коробки должны быть сожжены.
- Необходимо сушить и проветрять улья.
- Использовать всегда чистые и стерильные рамы и коробки.
- Старых или слабых королев необходимо заменить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Мыть руки после использования.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30  $^{\circ}$  С

**УПАКОВКА:** (60) г.