

# OXUVITAMIN-S

## ОКСИВИТАМИН - S

Водорастворимый порошок



**СОСТАВ: Каждый грамм содержит:**

|                     |      |      |                     |       |    |
|---------------------|------|------|---------------------|-------|----|
| Окситетрациклин HCl | 50   | мг   | Ca-D-пантотенат     | 0.55  | мг |
| Витамин А           | 2500 | М.Е. | Никотиновая кислота | 1     | мг |
| Витамин D3          | 500  | М.Е. | Витамин К3          | 0.20  | мг |
| Витамин Е           | 1    | М.Е. | Сульфат цинка       | 0.15  | мг |
| Витамин В1-HCL      | 0.2  | мг   | Сульфат меди        | 0.04  | мг |
| Витамин В2          | 0.2  | мг   | Хлорид кобальта     | 0.01  | мг |
| Витамин В6 - HCL    | 0.3  | мг   | Сульфат железа      | 0.306 | мг |
| Витамин В12         | 0.5  | мкг  | Сульфат марганца    | 0.40  | мг |

### СВОЙСТВА:

- Окситетрациклин - антибиотик широкого спектра действия, обладающий бактериостатическим эффектом против большого числа грам-положительных и грам-отрицательных микроорганизмов, (стрептококк, стафилококк, пастереллы, бруцеллы, коринебактерии, эризипелотрикс, колиформные бактерии, сальмонеллы), а также против риккетсий, микоплазм, хламидий и некоторых простейших.
- Витамины и минеральные вещества активируются, повышают жизнеспособность и поддерживают устойчивость организма к болезням.

### ПОКАЗАНИЯ:

- Профилактика и лечение различных инфекций респираторного, пищевого и урогенитального трактов, таких как: Микоплазмоз, хронические респираторные инфекции, насморк, колибактериоз, омфалит и инфекция желчного пузыря, энтерит, сальмонеллез, пастереллез, некротический энтерит (клостридия), воздушный суккулит, синусит, синовит, Стафилококк, Стрептококк, корин, шестимедиазит, спирохетоз, листерия, лептоспира Вибрио, диарея.
- Состояние стресса из-за вакцинации, дебакинга, транспортировки, повторной высадки, изменений корма и погоды и т. д.

### ДОЗИРОВКА:

- **Лечение:**
  - Птица: 500 г на 200 литров питьевой воды в течение 3-5 дней.
  - Телята, ягнята, козлята: 6 г на 20 кг массы тела ежедневно с питьевой водой в течение 3-5 дней.

- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

**Время выведения препарата:** (после последнего лечения)

- Для потребления мяса: 14 дней.
- Для потребления яиц: 4 дня.

**Замечание:** во время лечения не добавлять минеральные соли в лечебную воду.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 25 °С.

**УПАКОВКА:** (100, 250, 500, 1000) г.