

# أوكسيدون - 3%

محلول للحقن

للحيوانات المختلفة

التركيب: كل مل يحتوي على:

أوكسي تراسايكلين هيدروكلورايد 30 ملغم

الخواص:

الصاد البكتيري واسع الطيف وجهازي الفاعلية ضد البكتيريا التالية:

- البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية: المكورات العنقودية والعقدية والكوراين والكلوستريديا والأرسيبلوثيريكس.
- البكتيريا ذات صبغة جرام السلبية: (الكولي والباستيريلا والعصيات الشعاعية والموراكسلا).
- المايكونيلازما والأوليات (البروتوزوا) والهيوفيلوس والسبiroكينا والكلاميديا واللوبوسيرا والركتسيا والليستيريا وبعض الفيروسات الكبيرة.
- امتصاصه وانتشاره في الجسم سريع.

الأستطبابات:

■ للضأن والماعز والأبقار والجوميس والجمال والخنازير والكلاب والقطط والأرانب والدواجن.

■ معالجة الحالات التالية:

- حمى الشحن (الباستيريلا)، اللسان المتخشب (اكتينوباسيلوس)، التهاب القرنية والملتحمة الخمجي (موراكسلا)، تعفن الظلف، دفتريا العجل، دوزنتاريا الخنازير (سبiroكينا)، رشح الخنازير، الأجاجاكينا المعدية في الخنازير.
- الأوليات (الأتابلازما، الثنيليريا)، اللوبوسيرا في العجل، الرشح القلبي في الأبقار (الركتسيا).
- إجهاض الكلاميديا في الضأن والماعز.
- الكلوستريديا: الأنتروتوكسيميما (زحار "دوزنتاريا" الحملان)، الجمرة العرضية، الإرتشاح الخبيث في الضأن.
- النزلات المعوية والإسهالات.
- الأنثنان الدموي، التقيح الدموي، التهاب الغشاء البريتوني، التهاب السرة والمفاصل، التهاب الجلد والجروح والخزاج.
- المعالجة الداعمة لالتهاب الضرع.
- أخماق الجهاز التنفسى: التهاب الرئة والشعب الهوائية والرشح الخ....
- أخماق الجهاز البولى: التهاب الكلى والمثانة الخ...
- أخماق الجهاز التناسلى: التهاب الرحم وعنقه، سسم الحمل الخ....
- الوقاية من التلوث والإلتهابات بعد الولادة والعمليات الجراحية.
- الأخماق البكتيرية المصاحبة للأمراض الفيروسية.
- الأرانب: الإسهالات والإلتهاب الرئوى والنزلات المعوية.
- الدواجن: الكولي، والتهاب التجاويف الأنفية والرشح المعدى (كورايزا) والرشح المزمن ومرض العرف الأزرق والمايكونيلازما.

**الجرعات:** (مدة المعالجة 3-5 أيام).

يعطى حقنًا عميقاً بالعضل أو تحت الجلد.

**الأبقار والجوميس والجمال والضأن والماعز والخنازير:**

1.3-0.5 مل / 10 كغم وزن جسم يومياً.

**الكلاب والقطط:**

1.6-0.8 مل / 5 كغم وزن جسم يومياً.

**الدواجن والأرانب:**

3.2-0.8 مل للحيوان الواحد يومياً.

يفضل تقسيم الجرعات على عدة مواقع حقن لتنقليل حدوث التهيج.

**فترة الأمان:**

لاستهلاك اللحوم: أسبوعان.

لاستهلاك الحليب: 5 أيام.

**تبيهات:**

يفضل تقسيم الجرعات على عدة مواقع حقن.

إحتمال حدوث تورم موضعي عابر لبضعة أيام في موقع الحقن.

لا يعطى مع البنسلين ومستحضرات الكالسيوم والحديد تجنباً لحدوث تداخلات دوائية.

**التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبرارة أقل من 30 ° م.

**العبوات:** (50، 100) مل.