

أوكسيدون - 5 %

محلول للحقن
للحيوانات المختلفة

التركيب: كل مل يحتوي على:

أوكسي تتراسايكلين هيدروكلورايد 50 ملغم

الخواص:

- الصاد البكتيري واسع الطيف وجهازي الفاعلية ضد البكتيريا التالية:
- البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية: المكورات العنقودية والعقدية والكوارين والكلوستريديا والأريسلوثريكس.
- البكتيريا ذات صبغة جرام السلبية: (الكولاي والباستريلا والعصيات الشعاعية والموراكسلا).
- المايكوبلازما والأوليات (البروتوزوا) والهيموفيلوس والسبيروكيئا والكلاميديا واللبتوسبيرا والركتسيا والليستيريا وبعض الفيروسات الكبيرة.
- امتصاصه وانتشاره في الجسم سريع.

الاستطبابات:

- للضأن والماعز والأبقار والجواميس والجمال والخنازير والكلاب والقطط والأرانب والدواجن.
- معالجة الحالات التالية:
- حمى الشحن (الباستريلا)، اللسان المتخشب (اكتينوباسيلوس)، التهاب القرنية والملتحمة الخمجي (موراكسلا)، تعفن الظلف، دفتريا العجول، دوزنتاريا الخنازير (سبيروكيئا)، رشح الخنازير، الأجلالكيئا المعدية في الخنازير.
- الأوليات (الأنابلازما، التابليريا)، اللبتوسبيرا في العجول، الرشح القلبي في الأبقار (الركتسيا).
- إجهاض الكلاميديا في الضأن والماعز.
- الكلوستريديا: الأنتروتوكسيما (زحار "دوزنتاريا" الحملان)، الجمرة العرضية، الإرتشاح الخبيث في الضأن.
- النزلات المعوية والإسهالات.
- الأنتان الدموي، النقيح الدموي، التهاب الغشاء البريتوني، التهاب السرة والمفاصل، التهاب الجلد والجروح والخراج.
- المعالجة الداعمة لالتهاب الضرع.
- أخماج الجهاز التنفسي: التهاب الرئة والشعب الهوائية والرشح الخ....
- أخماج الجهاز البولي: التهاب الكلى والمثانة الخ...
- أخماج الجهاز التناسلي: التهاب الرحم وعنقه، تسم الحمل الخ....
- الوقاية من التلوث والإلتهابات بعد الولادة والعمليات الجراحية.
- الأخماج البكتيرية المصاحبة للأمراض الفيروسية.
- الأرانب: الإسهالات والإلتهاب الرئوي والنزلات المعوية.
- الدواجن: الكولاي، و التهاب التجاويف الأنفية والرشح المعدي (كورايزا) والرشح المزمن ومرض العرف الأزرق والمايكوبلازما.

الجرعات: (مدة المعالجة 3-5 أيام).

- يعطى حقناً عميقاً بالعضل أو تحت الجلد.
- الأبقار والجواميس والجمال والضأن والماعز والخنازير:
0.3-0.8 مل / 10 كغم وزن جسم يومياً.
- الكلاب والقطط:
0.5-1 / 5 كغم وزن جسم يومياً.
- الدواجن والأرانب:
0.5-2 مل للحيوان الواحد يومياً.
- يفضل تقسيم الجرعات على عدة مواقع حقن لتقليل حدوث التهيج.

فترة الأمان:

- لاستهلاك اللحوم: أسبوعان.
- لاستهلاك الحليب: 5 أيام.

تنبيهات:

- يفضل تقسيم الجرعات على عدة مواقع حقن.
- احتمال حدوث تورم موضعي عابر لبضعة أيام في موقع الحقن.
- لا يعطى مع البنسلين ومستحضرات الكالسيوم والحديد تجنباً لحدوث تداخلات دوائية.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م°.

العبوات: (50، 100) مل.