

أوكسيدون - 500

(بلعات)

التركيب : كل بلعة تحتوي:

أوكسي تتراسايكلين هيدروكلورايد 500 ملغم

الاستطبابات :

- للضأن والماعز والأبقار والخيول والدواجن.
- الإصابات البكتيرية للأجهزة الهضمية: الاسهال , الدوسنتاريا الباسيلية, التهاب الأمعاء.
- امراض الجهاز التنفسي:الالتهاب الرئوي, الالتهاب الشعبي , التهاب الغشاء البللوري, خناق المواشي.
- امراض الجهاز التناسلي : التهاب الرحم, التهاب المهبل.
- تسمم الدم , الدفتيريا, التهاب السرة.
- الإصابات الجلدية والجروح وتعفن الظلف والدفتريا والانتان الدموي.
- الإصابات البكتيرية نتيجة الإلتهابات الفيروسية.
- بعد الولادة وبعد العمليات الجراحية.
- يستعمل في الدواجن في حالات البارانتيفويد، مرض المنقار الأزرق، فقدان الشهية نتيجة التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بالإضافة الى التهاب الأكياس الهوائية في الحبش.

الجرعات :

تعطى مرة واحدة يومياً لمدة (2 - 3) أيام، وفي الحالات الشديدة تستمر المعالجة ليوم آخر .

أمراض الجهاز التنفسي والحالات الأخرى	الاسهالات والنزلات المعوية	وزن (كغم)
4 - 2 10 - 4 20 - 8	1 3 - 2 4 - 3	الابقار والعجول 90 - 45 225 - 135 450 - 225
1 - 2 / 1 1	2 / 1 1	الضأن والماعز والحملان والسخول لغاية 9 18 - 9
2 - 1	2 - 1	45 - 18
----	1.5 - 1 3 - 2	الخيول لغاية 135 135 فأكثر

- الدواجن: 1- 2 بلعة لكل 30 طير.

تنبيهات:

- إذا لم يحصل أي تحسن خلال 36-48 ساعة يجب إعادة تشخيص الحالة.
- في حال حدوث أية أعراض جانبية توقف عن إعطاء العلاج.

فترة الأمان : * لاستهلاك اللحوم والحليب: أسبوعان.

التخزين : مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م°.

العبوات : (50, 100) بلعة.