

أوكسي تتراسايكلين - 5 %

بودرة قابلة للذوبان في الماء
للنحل

التركيب: كل غم يحتوي على:

أوكسي تتراسايكلين هيدروكلورايد 50 ملغم

الإستطابات:

■ للوقاية ومعالجة الامراض البكتيرية التي تصيب النحل مثل: عفن الحضنة الامريكي و عفن الحضنة الاوروبي.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

■ المعالجة:

• بالتعفير:

- يخلط جيداً (60 غم) من المستحضر مع (240غم) سكر مطحون ناعم، ثم يتم تعفير سطح البراويز العلوية بمعدل (20غم) لكل خلية (2 غم لكل برواز).
- تكرر المعالجة بعد ثلاثة ايام.

• مع المحلول السكري:

- يذاب جيداً (6 غم) من المستحضر في كمية قليلة من الماء، ثم يمزج المحلول مع (1-2 لتر) من المحلول السكري (تركيز 1:1) لكل معالجة.
- تكرر المعالجة (3-5) مرات (وحسب شدة الاصابة) ويفاصل زمني (3) ايام بين كل مرة.

■ الوقاية:

- نصف الجرعة العلاجية لمدة (3) ايام ويفاصل زمني (3) ايام بين كل مرة.

تنبيهات:

- تكون المعالجة في الفترة المسائية حتى يتواجد جميع النحل السارح في الخلية.
- يجب عدم استعمال العلاج اثناء فترة التزهير وجمع الرحيق، وفي مثل هذه الحالة، لا يستعمل العسل الناتج للاستهلاك البشري، بل يتم استعماله لاغراض صناعية.
- يمكن المعالجة بعد انتهاء موسم جمع العسل، ويجب التوقف عن المعالجة قبل شهر من بدء الموسم التالي.
- يجب حرق جميع الصناديق والبراويز المصابة بشدة .
- يجب ان تكون الخلايا جافة مع تهويتها قبل الاستعمال.
- يجب استعمال الخلايا والبراويز النظيفة والمعقمة.
- يجب استبدال ملكات النحل المسنة والضعيفة باخرى قوية.

تحذيرات:

- يجب غسل اليدين بعد الاستخدام.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة اقل من 30 °م.

العبوات: (60) غم.