

PIROPLASMIN ПИРОПЛАЗМИН

Против простейших
Раствор для инъекций

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Диминазина ацетурат	75 мг
Антипирин	250 мг
Витамин В12	0,04 мкг

СВОЙСТВА:

- Диминазин является активным антипротозойным средством против пироплазмы (babesia), инфекции трипаномы.
- Антипирин: анальгетик, противовоспалительное и жаропонижающее вещество.
- Витамин В12: от анемии.

ПОКАЗАНИЯ:

для контроля и лечения инфекций, вызванных паразитами в крови (трипаносома, бабезия) у овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов и собак.

ДОЗИРОВКА: инъекция глубоко внутримышечно.

- лошадь, крупный рогатый скот, козы и овцы: 1 мл / 25 кг массы тела (равен 3 мг активного вещества / кг массы тела)
- Верблюды: 1 мл / 15 кг массы тела (5 мг активного вещества / кг массы тела)
- Собаки: 1 мл / 22 кг массы тела (3,5 мг активного вещества / кг массы тела)

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

Для потребления мяса: 21 день.

Для потребления молока: - овцы, козы: 7 дней

- крупный рогатый скот: 21 день.

Внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- *Необходимо определить вес верблюда, чтобы обеспечить точное введение безопасной дозы препарата (важно!)*
- Не использовать для животных, которые нечувствительны к компонентам.
- Не превышать рекомендуемые дозы.
- В месте инъекции может возникать небольшая локальная реакция.
- Разделить дозу на два разных инъекционных участка
- Предпочтительно давать **ПИРОПЛАЗМИН** рано утром.

- Для беременных и кормящих животных: обратитесь к ветеринару. Давать по мере необходимости.
- Лечение можно повторять с интервалом в два дня.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре ниже 30°С.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.